Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Ensemble des entiers naturels

Définitions

On admet l'existence d'un ensemble ordonné non vide $(\mathbb{N}, \leq)$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

Ensemble des entiers naturels

Définitions

On admet l'existence d'un ensemble ordonné non vide $(\mathbb{N}, \leq)$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

- 1. Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

On admet l'existence d'un ensemble ordonné non vide $(\mathbb{N}, \leq)$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

- 1) Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément.
- 2) Toute partie non vide majorée de $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

On admet l'existence d'un ensemble ordonné non vide $(\mathbb{N}, \leq)$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

- i) Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément.
- ii) Toute partie non vide majorée de $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément.
- iii) $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné,

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré,

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n)

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n + 1$

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n+1$ et est appelé successeur de n .

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n + 1$ et est appelé successeur de n .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / k < n\}$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n+1$ et est appelé successeur de n .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / k < n\}$. On a $A \neq \emptyset$ (car $0 \in A$),

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n+1$ et est appelé successeur de n .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / k < n\}$. On a $A \neq \emptyset$ (car $0 \in A$), $A \subset \mathbb{N}$

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$. En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n + 1$ et est appelé successeur de n .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / k < n\}$. On a $A \neq \emptyset$ (car $0 \in A$), $A \subset \mathbb{N}$ et A est majorée (par n)

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$.
En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n + 1$ et est appelé successeur de n .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / k < n\}$. On a $A \neq \emptyset$ (car $0 \in A$), $A \subset \mathbb{N}$ et A est majorée (par n) d'où A possède un plus grand élément.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$. En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n + 1$ et est appelé successeur de n .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / k < n\}$. On a $A \neq \emptyset$ (car $0 \in A$), $A \subset \mathbb{N}$ et A est majorée (par n) d'où A possède un plus grand élément. Ce plus grand élément de A est noté $n - 1$ et

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Remarques 1.1

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, i.e., $\forall(x, y) \in \mathbb{N}^2, x \leq y$ ou $y \leq x$. En effet, soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On a $\{x, y\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où $\{x, y\}$ possède un plus petit élément et ainsi x et y sont comparables.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, sinon, $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément, ce qui est faux.
- 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ privé de 0 est noté $\mathbb{N}^*$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / n < k\}$. On a $A \neq \emptyset$ (sinon $\mathbb{N}$ est majorée par n) et $A \subset \mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Ce plus petit élément de A est noté $n + 1$ et est appelé successeur de n .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $A = \{k \in \mathbb{N} / k < n\}$. On a $A \neq \emptyset$ (car $0 \in A$), $A \subset \mathbb{N}$ et A est majorée (par n) d'où A possède un plus grand élément. Ce plus grand élément de A est noté $n - 1$ et est appelé prédécesseur de n .

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fausse.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fausse. Alors, il existe $c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} : nd < c$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fausse. Alors, il existe $c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} : nd < c$. Posons $A = \{c - nd / n \in \mathbb{N}\}$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fausse. Alors, il existe $c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} : nd < c$. Posons $A = \{c - nd / n \in \mathbb{N}\}$. On a A est une partie non vide de $\mathbb{N}$

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fausse. Alors, il existe $c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} : nd < c$. Posons $A = \{c - nd / n \in \mathbb{N}\}$. On a A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fausse. Alors, il existe $c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} : nd < c$. Posons $A = \{c - nd / n \in \mathbb{N}\}$. On a A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Soit $c - md$ le plus petit élément de A , avec $m \in \mathbb{N}$.

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fautive. Alors, il existe $c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} : nd < c$. Posons $A = \{c - nd / n \in \mathbb{N}\}$. On a A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Soit $c - md$ le plus petit élément de A , avec $m \in \mathbb{N}$. On a $c - (m+1)d \in A$;

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fausse. Alors, il existe $c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} : nd < c$. Posons $A = \{c - nd / n \in \mathbb{N}\}$. On a A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Soit $c - md$ le plus petit élément de A , avec $m \in \mathbb{N}$. On a $c - (m+1)d \in A$; cependant, $c - (m+1)d = (c - md) - d < c - md$,

Ensemble des entiers naturels

Définitions

Théorème 1.2 (Propriété d'archimède)

$$\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N} : nb \geq a.$$

Démonstration.

Supposons que la propriété est fausse. Alors, il existe $c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} : nd < c$. Posons $A = \{c - nd / n \in \mathbb{N}\}$. On a A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément. Soit $c - md$ le plus petit élément de A , avec $m \in \mathbb{N}$. On a $c - (m+1)d \in A$; cependant, $c - (m+1)d = (c - md) - d < c - md$, contradiction car $c - md$ est le plus petit élément de A . □

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
 - 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,
- alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

① $P(n_0)$ est vraie,

② Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$. Alors, A possède un plus petit élément qu'on note m .

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

① $P(n_0)$ est vraie,

② Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$. Alors, A possède un plus petit élément qu'on note m . Puisque $P(n_0)$ est vraie et $m \in A$, $m > n_0$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$. Alors, A possède un plus petit élément qu'on note m . Puisque $P(n_0)$ est vraie et $m \in A$, $m > n_0$ d'où $m-1 \geq n_0$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$. Alors, A possède un plus petit élément qu'on note m . Puisque $P(n_0)$ est vraie et $m \in A$, $m > n_0$ d'où $m-1 \geq n_0$. Comme $m-1 < m$ et $m-1 \geq n_0$, $m-1 \notin A$ car m est le plus petit élément de A

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$. Alors, A possède un plus petit élément qu'on note m . Puisque $P(n_0)$ est vraie et $m \in A$, $m > n_0$ d'où $m-1 \geq n_0$. Comme $m-1 < m$ et $m-1 \geq n_0$, $m-1 \notin A$ car m est le plus petit élément de A donc $P(m-1)$ est vraie.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$. Alors, A possède un plus petit élément qu'on note m . Puisque $P(n_0)$ est vraie et $m \in A$, $m > n_0$ d'où $m-1 \geq n_0$. Comme $m-1 < m$ et $m-1 \geq n_0$, $m-1 \notin A$ car m est le plus petit élément de A donc $P(m-1)$ est vraie. Alors, d'après la deuxième propriété, $P(m)$ est vraie,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$. Alors, A possède un plus petit élément qu'on note m . Puisque $P(n_0)$ est vraie et $m \in A$, $m > n_0$ d'où $m-1 \geq n_0$. Comme $m-1 < m$ et $m-1 \geq n_0$, $m-1 \notin A$ car m est le plus petit élément de A donc $P(m-1)$ est vraie. Alors, d'après la deuxième propriété, $P(m)$ est vraie, ce qui contredit le fait que $m \in A$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.3 (Principe de l'induction mathématique)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie,

alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n_0$ et $P(k)$ est fausse. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \text{ et } P(n) \text{ est fausse}\}$. On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $k \in A$. Alors, A possède un plus petit élément qu'on note m . Puisque $P(n_0)$ est vraie et $m \in A$, $m > n_0$ d'où $m-1 \geq n_0$. Comme $m-1 < m$ et $m-1 \geq n_0$, $m-1 \notin A$ car m est le plus petit élément de A donc $P(m-1)$ est vraie. Alors, d'après la deuxième propriété, $P(m)$ est vraie, ce qui contredit le fait que $m \in A$. Alors, Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie. □

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} :$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

On a $P(0)$ est vraie car $\sum_{k=0}^0 k = 0$ et $\frac{0 \times 1}{2} = 0$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

On a $P(0)$ est vraie car $\sum_{k=0}^0 k = 0$ et $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Supposons que $P(n)$ est

vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$, i.e., $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

On a $P(0)$ est vraie car $\sum_{k=0}^0 k = 0$ et $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Supposons que $P(n)$ est

vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$, i.e., $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^{n+1} k =$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

On a $P(0)$ est vraie car $\sum_{k=0}^0 k = 0$ et $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Supposons que $P(n)$ est

vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$, i.e., $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \sum_{k=0}^n k + (n+1) =$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

On a $P(0)$ est vraie car $\sum_{k=0}^0 k = 0$ et $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Supposons que $P(n)$ est

vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$, i.e., $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \sum_{k=0}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

On a $P(0)$ est vraie car $\sum_{k=0}^0 k = 0$ et $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Supposons que $P(n)$ est

vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$, i.e., $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \sum_{k=0}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \text{ car d'après } P(n),$$

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

On a $P(0)$ est vraie car $\sum_{k=0}^0 k = 0$ et $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Supposons que $P(n)$ est

vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$, i.e., $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \sum_{k=0}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \text{ car d'après } P(n),$$

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \text{ ainsi } \sum_{k=0}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \text{ et donc } P(n+1) \text{ est vraie.}$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.4

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

On a $P(0)$ est vraie car $\sum_{k=0}^0 k = 0$ et $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Supposons que $P(n)$ est

vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$, i.e., $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \sum_{k=0}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \text{ car d'après } P(n),$$

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \text{ ainsi } \sum_{k=0}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \text{ et donc } P(n+1) \text{ est vraie.}$$

$$\text{Alors, } \forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.5 (Récurrence à deux pas)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.5 (Récurrence à deux pas)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.5 (Récurrence à deux pas)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ et $P(n + 1)$ sont vraies implique $P(n + 2)$ est vraie,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.5 (Récurrence à deux pas)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ et $P(n + 1)$ sont vraies implique $P(n + 2)$ est vraie,

alors Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Démonstration.

Posons $Q(n) = P(n) \wedge P(n+1)$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Démonstration.

Posons $Q(n) = P(n) \wedge P(n+1)$. Puisque $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies, $Q(n_0)$ est vraie.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Démonstration.

Posons $Q(n) = P(n) \wedge P(n+1)$. Puisque $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies, $Q(n_0)$ est vraie. Soit $n \geq n_0$. Supposons que $Q(n)$ est vraie.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Démonstration.

Posons $Q(n) = P(n) \wedge P(n+1)$. Puisque $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies, $Q(n_0)$ est vraie. Soit $n \geq n_0$. Supposons que $Q(n)$ est vraie. Alors, $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Démonstration.

Posons $Q(n) = P(n) \wedge P(n+1)$. Puisque $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies, $Q(n_0)$ est vraie. Soit $n \geq n_0$. Supposons que $Q(n)$ est vraie. Alors, $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies d'où $P(n+2)$ est vraie

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Démonstration.

Posons $Q(n) = P(n) \wedge P(n+1)$. Puisque $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies, $Q(n_0)$ est vraie. Soit $n \geq n_0$. Supposons que $Q(n)$ est vraie. Alors, $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies d'où $P(n+2)$ est vraie ainsi $Q(n+1)$ est vraie

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Démonstration.

Posons $Q(n) = P(n) \wedge P(n+1)$. Puisque $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies, $Q(n_0)$ est vraie. Soit $n \geq n_0$. Supposons que $Q(n)$ est vraie. Alors, $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies d'où $P(n+2)$ est vraie ainsi $Q(n+1)$ est vraie et donc, d'après le Principe de l'induction mathématique, pour tout entier $n \geq n_0$, $Q(n)$ est vraie,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Démonstration.

Posons $Q(n) = P(n) \wedge P(n+1)$. Puisque $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies, $Q(n_0)$ est vraie. Soit $n \geq n_0$. Supposons que $Q(n)$ est vraie. Alors, $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies d'où $P(n+2)$ est vraie ainsi $Q(n+1)$ est vraie et donc, d'après le Principe de l'induction mathématique, pour tout entier $n \geq n_0$, $Q(n)$ est vraie, alors pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie. $\square$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$:

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$. On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$. On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$. Aussi, $P(1)$ est vraie car $u_1 = 5$ et $2^1 + 3^1 = 5$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$.

On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$. Aussi, $P(1)$ est vraie car $u_1 = 5$ et $2^1 + 3^1 = 5$.

Supposons que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies à un rang $n \in \mathbb{N}$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$.

On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$. Aussi, $P(1)$ est vraie car $u_1 = 5$ et $2^1 + 3^1 = 5$.

Supposons que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies à un rang $n \in \mathbb{N}$. On a

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n,$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$.

On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$. Aussi, $P(1)$ est vraie car $u_1 = 5$ et $2^1 + 3^1 = 5$.

Supposons que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies à un rang $n \in \mathbb{N}$. On a $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$, alors $u_{n+2} = 5(2^{n+1} + 3^{n+1}) - 6(2^n + 3^n)$ car $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3^{n+1}$ et $u_n = 2^n + 3^n$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$.

On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$. Aussi, $P(1)$ est vraie car $u_1 = 5$ et $2^1 + 3^1 = 5$.

Supposons que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies à un rang $n \in \mathbb{N}$. On a $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$, alors $u_{n+2} = 5(2^{n+1} + 3^{n+1}) - 6(2^n + 3^n)$ car $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3^{n+1}$ et $u_n = 2^n + 3^n$. Ainsi,

$$u_{n+2} = 5 \cdot 2^{n+1} + 5 \cdot 3^{n+1} - 3 \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 3^{n+1} =$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$.

On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$. Aussi, $P(1)$ est vraie car $u_1 = 5$ et $2^1 + 3^1 = 5$.

Supposons que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies à un rang $n \in \mathbb{N}$. On a $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$, alors $u_{n+2} = 5(2^{n+1} + 3^{n+1}) - 6(2^n + 3^n)$ car $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3^{n+1}$ et $u_n = 2^n + 3^n$. Ainsi,

$$u_{n+2} = 5 \cdot 2^{n+1} + 5 \cdot 3^{n+1} - 3 \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 3^{n+1} = 2^{n+2} + 3^{n+2}$$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$.

On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$. Aussi, $P(1)$ est vraie car $u_1 = 5$ et $2^1 + 3^1 = 5$.

Supposons que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies à un rang $n \in \mathbb{N}$. On a $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$, alors $u_{n+2} = 5(2^{n+1} + 3^{n+1}) - 6(2^n + 3^n)$ car $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3^{n+1}$ et $u_n = 2^n + 3^n$. Ainsi,
 $u_{n+2} = 5 \cdot 2^{n+1} + 5 \cdot 3^{n+1} - 3 \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 3^{n+1} = 2^{n+2} + 3^{n+2}$ donc $P(n+2)$ est vraie.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.6

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrons par récurrence à deux pas que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n) : u_n = 2^n + 3^n$.

On a $P(0)$ est vraie car $u_0 = 2$ et $2^0 + 3^0 = 2$. Aussi, $P(1)$ est vraie car $u_1 = 5$ et $2^1 + 3^1 = 5$.

Supposons que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies à un rang $n \in \mathbb{N}$. On a $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$, alors $u_{n+2} = 5(2^{n+1} + 3^{n+1}) - 6(2^n + 3^n)$ car $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3^{n+1}$ et $u_n = 2^n + 3^n$. Ainsi,
 $u_{n+2} = 5 \cdot 2^{n+1} + 5 \cdot 3^{n+1} - 3 \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 3^{n+1} = 2^{n+2} + 3^{n+2}$ donc $P(n+2)$ est vraie. Alors, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.7 (Récurrence forte)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.7 (Récurrence forte)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.7 (Récurrence forte)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si pour tout entier k tel que $n_0 \leq k \leq n$, $P(k)$ est vraie implique $P(n+1)$ est vraie,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.7 (Récurrence forte)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si pour tout entier k tel que $n_0 \leq k \leq n$, $P(k)$ est vraie implique $P(n+1)$ est vraie,

alors Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Théorème 1.7 (Récurrence forte)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une proposition dépendante de n , où $n \in \mathbb{N}$. Si

- 1 $P(n_0)$ est vraie,
- 2 Pour tout entier $n \geq n_0$, si pour tout entier k tel que $n_0 \leq k \leq n$, $P(k)$ est vraie implique $P(n+1)$ est vraie,

alors Pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Démonstration.

Comme pour la démonstration du théorème précédent, il suffit de considérer $Q(n) = P(n_0) \wedge \dots \wedge P(n)$ et appliquer le Principe de l'induction mathématique à $Q(n)$. □

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m + 1)$:

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m + 1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m + 1)$.*

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m + 1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m + 1)$.*

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m + 1)$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.*

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies.*

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m + 1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m + 1)$.*

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m + 1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n + 1)$ est vraie :*

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m + 1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m + 1)$.*

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m + 1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n + 1)$ est vraie :*

Si $n + 1$ est impair,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m + 1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m + 1)$.*

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m + 1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n + 1)$ est vraie :*

Si $n + 1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n + 1 = 2m + 1$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m + 1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m + 1)$.*

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m + 1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n + 1)$ est vraie :*

Si $n + 1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n + 1 = 2m + 1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n + 1 = 2^k(2m + 1)$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.*

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :*

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^*$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.*

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :*

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^$ et on a $1 \leq q \leq n$*

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^*$ et on a $1 \leq q \leq n$ ainsi $P(q)$ est vraie,

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^*$ et on a $1 \leq q \leq n$ ainsi $P(q)$ est vraie, i.e., il existe $(k', m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $q = 2^{k'}(2m+1)$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^*$ et on a $1 \leq q \leq n$ ainsi $P(q)$ est vraie, i.e., il existe $(k', m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $q = 2^{k'}(2m+1)$ d'où $n+1 =$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^*$ et on a $1 \leq q \leq n$ ainsi $P(q)$ est vraie, i.e., il existe $(k', m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $q = 2^{k'}(2m+1)$ d'où $n+1 = 2q =$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^*$ et on a $1 \leq q \leq n$ ainsi $P(q)$ est vraie, i.e., il existe $(k', m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $q = 2^{k'}(2m+1)$ d'où $n+1 = 2q = 2 \cdot 2^{k'}(2m+1)$

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^*$ et on a $1 \leq q \leq n$ ainsi $P(q)$ est vraie, i.e., il existe $(k', m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $q = 2^{k'}(2m+1)$ d'où $n+1 = 2q = 2 \cdot 2^{k'}(2m+1)$ et ainsi il existe $k = k' + 1, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Ensemble des entiers naturels

Raisonnement par récurrence

Exemple 1.8

Soit n un entier naturel non nul. Montrons par récurrence forte qu'il existe $k, m \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^k(2m+1)$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la proposition : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

On a $P(1)$ est vraie car il existe $k = 0, m = 0 \in \mathbb{N}$ tels que $1 = 2^k(2m+1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que $P(1), P(2), \dots, P(n)$ sont vraies. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

Si $n+1$ est impair, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n+1 = 2m+1$ ainsi il existe $k = 0, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$.

Si $n+1$ est pair, alors $q = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}^*$ et on a $1 \leq q \leq n$ ainsi $P(q)$ est vraie, i.e., il existe $(k', m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $q = 2^{k'}(2m+1)$ d'où $n+1 = 2q = 2 \cdot 2^{k'}(2m+1)$ et ainsi il existe $k = k' + 1, m \in \mathbb{N}$ tels que $n+1 = 2^k(2m+1)$. Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2^k(2m+1)$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.1 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$)

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.1 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*,$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.1 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*, \exists ! (q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < |b|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.1 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*, \exists ! (q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < |b|$.

q est appelé **quotient** de la division euclidienne de a par b et r est **le reste**.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$:

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb =$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a|$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb/x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,
 $a - (q+1)b =$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,
$$a - (q+1)b = (a - qb) - b =$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,
$$a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,
 $a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,
 $a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0$ d'où $a - (q+1)b \in A$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,
 $a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0$ d'où $a - (q+1)b \in A$.
Cependant, $a - (q+1)b =$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,
 $a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0$ d'où $a - (q+1)b \in A$.
Cependant, $a - (q+1)b = r - b < r$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,

$a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0$ d'où $a - (q+1)b \in A$.

Cependant, $a - (q+1)b = r - b < r$ ce qui contredit le fait que r est le plus petit élément de A .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,

$$a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0 \text{ d'où } a - (q+1)b \in A.$$

Cependant, $a - (q+1)b = r - b < r$ ce qui contredit le fait que r est le plus petit élément de A . Ainsi, on a montré qu'il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b = |b|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,

$$a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0 \text{ d'où } a - (q+1)b \in A.$$

Cependant, $a - (q+1)b = r - b < r$ ce qui contredit le fait que r est le plus petit élément de A . Ainsi, on a montré qu'il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b = |b|$.

- Si $b < 0$:

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,

$$a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0 \text{ d'où } a - (q+1)b \in A.$$

Cependant, $a - (q+1)b = r - b < r$ ce qui contredit le fait que r est le plus petit élément de A . Ainsi, on a montré qu'il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b = |b|$.

- Si $b < 0$: on a $-b > 0$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,

$$a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0 \text{ d'où } a - (q+1)b \in A.$$

Cependant, $a - (q+1)b = r - b < r$ ce qui contredit le fait que r est le plus petit élément de A . Ainsi, on a montré qu'il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b = |b|$.

- Si $b < 0$: on a $-b > 0$. Alors, en appliquant le cas précédent, il existe $(q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = (-b)q' + r'$ avec $0 \leq r' < -b$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- Si $b > 0$: on considère $A = \{a - xb / x \in \mathbb{Z} \text{ et } a - xb \geq 0\}$. On a $A \neq \emptyset$, en effet, puisque $b \geq 1$, $|a|b \geq |a|$ ainsi, en prenant $x = -|a|$, on a $a - xb = a - (-|a|)b = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ d'où $a - xb \in A$. Alors, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc A possède un plus petit élément qu'on note r . Puisque $r \in A$, $r = a - qb$, où $q \in \mathbb{Z}$. Aussi, puisque $r \in A$, $r \geq 0$.

On a aussi $r < b$, en effet : supposons que $b \leq r$. Alors,

$$a - (q+1)b = (a - qb) - b = r - b \geq 0 \text{ d'où } a - (q+1)b \in A.$$

Cependant, $a - (q+1)b = r - b < r$ ce qui contredit le fait que r est le plus petit élément de A . Ainsi, on a montré qu'il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b = |b|$.

- Si $b < 0$: on a $-b > 0$. Alors, en appliquant le cas précédent, il existe $(q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = (-b)q' + r'$ avec $0 \leq r' < -b$ et donc il existe $q = -q', r = r' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < -b = |b|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors,
$$r - r' = b(q' - q)$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$, $-|b| < r - r' < |b|$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$, $-|b| < r - r' < |b|$ ainsi $|r - r'| < |b|$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$, $-|b| < r - r' < |b|$ ainsi $|r - r'| < |b|$ d'où $|b||q' - q| < |b|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$, $-|b| < r - r' < |b|$ ainsi $|r - r'| < |b|$ d'où $|b||q' - q| < |b|$. Alors, $|q' - q| = 0$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$, $-|b| < r - r' < |b|$ ainsi $|r - r'| < |b|$ d'où $|b||q' - q| < |b|$. Alors, $|q' - q| = 0$ ainsi $q - q' = 0$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$, $-|b| < r - r' < |b|$ ainsi $|r - r'| < |b|$ d'où $|b||q' - q| < |b|$. Alors, $|q' - q| = 0$ ainsi $q - q' = 0$ donc $q' = q$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$, $-|b| < r - r' < |b|$ ainsi $|r - r'| < |b|$ d'où $|b||q' - q| < |b|$. Alors, $|q' - q| = 0$ ainsi $q - q' = 0$ donc $q' = q$. Comme $|r - r'| = |b||q' - q|$ et $q = q'$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Démonstration.

Unicité : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Supposons qu'il existe $(q, r), (q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < |b|$ et $0 \leq r' < |b|$. Alors, $r - r' = b(q' - q)$ d'où $|r - r'| = |b||q' - q|$. Comme $0 \leq r < |b|$ et $-|b| < -r' \leq 0$, $-|b| < r - r' < |b|$ ainsi $|r - r'| < |b|$ d'où $|b||q' - q| < |b|$. Alors, $|q' - q| = 0$ ainsi $q - q' = 0$ donc $q' = q$. Comme $|r - r'| = |b||q' - q|$ et $q = q'$, $r' = r$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Si $a < b$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Si $a < b$, on a $q = 0$ et $r = a$ car $a = 0 \times b + a$ avec $0 \leq r < b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Si $a < b$, on a $q = 0$ et $r = a$ car $a = 0 \times b + a$ avec $0 \leq r < b$.

Si $a \geq b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Si $a < b$, on a $q = 0$ et $r = a$ car $a = 0 \times b + a$ avec $0 \leq r < b$.

Si $a \geq b$. D'après le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$, il existe un, et un seul, $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec avec $0 \leq r < |b| = b$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Si $a < b$, on a $q = 0$ et $r = a$ car $a = 0 \times b + a$ avec $0 \leq r < b$.

Si $a \geq b$. D'après le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$, il existe un, et un seul, $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec avec $0 \leq r < |b| = b$ ainsi $r \in \mathbb{N}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Si $a < b$, on a $q = 0$ et $r = a$ car $a = 0 \times b + a$ avec $0 \leq r < b$.

Si $a \geq b$. D'après le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$, il existe un, et un seul, $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec avec $0 \leq r < |b| = b$ ainsi $r \in \mathbb{N}$. Aussi, on a $a > r$ car $b > r$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Si $a < b$, on a $q = 0$ et $r = a$ car $a = 0 \times b + a$ avec $0 \leq r < b$.

Si $a \geq b$. D'après le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$, il existe un, et un seul, $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec avec $0 \leq r < |b| = b$ ainsi $r \in \mathbb{N}$. Aussi, on a $a > r$ car $b > r$, donc $bq = a - r > 0$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$)

$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Si $a < b$, on a $q = 0$ et $r = a$ car $a = 0 \times b + a$ avec $0 \leq r < b$.

Si $a \geq b$. D'après le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$, il existe un, et un seul, $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec avec $0 \leq r < |b| = b$ ainsi $r \in \mathbb{N}$. Aussi, on a $a > r$ car $b > r$, donc $bq = a - r > 0$ et puisque $b \in \mathbb{N}^*$, on a $q \in \mathbb{N}$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q+1$ et donc $q = E\left(\frac{a}{b}\right)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q+1$ et donc $q = E(\frac{a}{b})$ et $r = a - b.E(\frac{a}{b})$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$ et donc $q = E(\frac{a}{b})$ et $r = a - b.E(\frac{a}{b})$.
- 2 Si $b < 0$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q+1$ et donc $q = E(\frac{a}{b})$ et $r = a - b.E(\frac{a}{b})$.
- 2 Si $b < 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < -b$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q+1$ et donc $q = E(\frac{a}{b})$ et $r = a - b.E(\frac{a}{b})$.
- 2 Si $b < 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < -b$ d'où $-\frac{a}{b} = (-q) + (-\frac{r}{b})$ avec $0 \leq -\frac{r}{b} < 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$ et donc $q = E(\frac{a}{b})$ et $r = a - b.E(\frac{a}{b})$.
- 2 Si $b < 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < -b$ d'où $-\frac{a}{b} = (-q) + (-\frac{r}{b})$ avec $0 \leq -\frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq -\frac{a}{b} + q < 1$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$ et donc $q = E(\frac{a}{b})$ et $r = a - b.E(\frac{a}{b})$.
- 2 Si $b < 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < -b$ d'où $-\frac{a}{b} = (-q) + (-\frac{r}{b})$ avec $0 \leq -\frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq -\frac{a}{b} + q < 1$, i.e., $-q \leq -\frac{a}{b} < -q + 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$ et donc $q = E(\frac{a}{b})$ et $r = a - b.E(\frac{a}{b})$.
- 2 Si $b < 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < -b$ d'où $-\frac{a}{b} = (-q) + (-\frac{r}{b})$ avec $0 \leq -\frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq -\frac{a}{b} + q < 1$, i.e., $-q \leq -\frac{a}{b} < -q + 1$ et donc $q = -E(-\frac{a}{b})$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Remarque 2.3

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- 1 Si $b > 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ d'où $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq \frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq \frac{a}{b} - q < 1$, i.e., $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$ et donc $q = E(\frac{a}{b})$ et $r = a - b.E(\frac{a}{b})$.
- 2 Si $b < 0$. Alors, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < -b$ d'où $-\frac{a}{b} = (-q) + (-\frac{r}{b})$ avec $0 \leq -\frac{r}{b} < 1$ ainsi $0 \leq -\frac{a}{b} + q < 1$, i.e., $-q \leq -\frac{a}{b} < -q + 1$ et donc $q = -E(-\frac{a}{b})$ et $r = a + b.E(-\frac{a}{b})$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Exemples 2.4

- 1 Pour $a = 2015$ et $b = 15$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Exemples 2.4

① Pour $a = 2015$ et $b = 15$, on a $q = E\left(\frac{a}{b}\right) = 134$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Exemples 2.4

- 1 Pour $a = 2015$ et $b = 15$, on a $q = E\left(\frac{a}{b}\right) = 134$ et $r = a - bq = 5$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Exemples 2.4

- 1 Pour $a = 2015$ et $b = 15$, on a $q = E\left(\frac{a}{b}\right) = 134$ et $r = a - bq = 5$.
- 2 Pour $a = 2016$ et $b = -67$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Exemples 2.4

- 1 Pour $a = 2015$ et $b = 15$, on a $q = E\left(\frac{a}{b}\right) = 134$ et $r = a - bq = 5$.
- 2 Pour $a = 2016$ et $b = -67$, on a $q = -\left[-\frac{a}{b}\right] = -30$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Théorème de la division euclidienne

Exemples 2.4

- 1 Pour $a = 2015$ et $b = 15$, on a $q = E\left(\frac{a}{b}\right) = 134$ et $r = a - bq = 5$.
- 2 Pour $a = 2016$ et $b = -67$, on a $q = -\left[-\frac{a}{b}\right] = -30$ et $r = a - bq = 16$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Définition 2.5

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Définition 2.5

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a divise b s'il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ac$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Définition 2.5

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a divise b s'il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ac$. Lorsque a divise b , on écrit $a \mid b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Définition 2.5

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a divise b s'il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ac$. Lorsque a divise b , on écrit $a \mid b$.

Remarque 2.6

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Si a divise b , on dit que a est un diviseur de b

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Définition 2.5

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a divise b s'il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ac$. Lorsque a divise b , on écrit $a \mid b$.

Remarque 2.6

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Si a divise b , on dit que a est un diviseur de b ou b est un multiple de a .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Définition 2.5

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a divise b s'il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ac$. Lorsque a divise b , on écrit $a \mid b$.

Remarque 2.6

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Si a divise b , on dit que a est un diviseur de b ou b est un multiple de a ou b est divisible par a .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Propriétés 2.7

Soit a, b, c et d des entiers.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Propriétés 2.7

Soit a, b, c et d des entiers.

① $a \mid 0$ et si $0 \mid b$, alors $b = 0$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Propriétés 2.7

Soit a, b, c et d des entiers.

- 1) $a \mid 0$ et si $0 \mid b$, alors $b = 0$.
- 2) $a \mid 1$ si, et seulement si, $a = \pm 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Propriétés 2.7

Soit a, b, c et d des entiers.

- 1) $a \mid 0$ et si $0 \mid b$, alors $b = 0$.
- 2) $a \mid 1$ si, et seulement si, $a = \pm 1$.
- 3) $a \mid b$ et $b \mid a$ si, et seulement si, $a = \pm b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Propriétés 2.7

Soit a, b, c et d des entiers.

- ① $a \mid 0$ et si $0 \mid b$, alors $b = 0$.
- ② $a \mid 1$ si, et seulement si, $a = \pm 1$.
- ③ $a \mid b$ et $b \mid a$ si, et seulement si, $a = \pm b$.
- ④ Si $a \mid b$ et $c \mid d$, alors $ac \mid bd$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Propriétés 2.7

Soit a, b, c et d des entiers.

- 1) $a \mid 0$ et si $0 \mid b$, alors $b = 0$.
- 2) $a \mid 1$ si, et seulement si, $a = \pm 1$.
- 3) $a \mid b$ et $b \mid a$ si, et seulement si, $a = \pm b$.
- 4) Si $a \mid b$ et $c \mid d$, alors $ac \mid bd$.
- 5) Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Propriétés 2.7

Soit a, b, c et d des entiers.

- 1) $a \mid 0$ et si $0 \mid b$, alors $b = 0$.
- 2) $a \mid 1$ si, et seulement si, $a = \pm 1$.
- 3) $a \mid b$ et $b \mid a$ si, et seulement si, $a = \pm b$.
- 4) Si $a \mid b$ et $c \mid d$, alors $ac \mid bd$.
- 5) Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
- 6) Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Propriétés 2.7

Soit a, b, c et d des entiers.

- 1) $a \mid 0$ et si $0 \mid b$, alors $b = 0$.
- 2) $a \mid 1$ si, et seulement si, $a = \pm 1$.
- 3) $a \mid b$ et $b \mid a$ si, et seulement si, $a = \pm b$.
- 4) Si $a \mid b$ et $c \mid d$, alors $ac \mid bd$.
- 5) Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
- 6) Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.
- 7) Si $a \mid b$ et $a \mid c$; alors pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}$, $a \mid bx + cy$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$;

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$. Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$ d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite $|k||a| > |k| \geq 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que
 $b = ha$ et $a = kb$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que
 $b = ha$ et $a = kb$ d'où $a = kha$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que
 $b = ha$ et $a = kb$ d'où $a = kha$ ainsi $hk = 1$ donc $h = \pm 1$ et par suite
 $a = \pm b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que
 $b = ha$ et $a = kb$ d'où $a = kha$ ainsi $hk = 1$ donc $h = \pm 1$ et par suite
 $a = \pm b$.
- Montrons 6) : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tels que $a \mid b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que
 $b = ha$ et $a = kb$ d'où $a = kha$ ainsi $hk = 1$ donc $h = \pm 1$ et par suite
 $a = \pm b$.
- Montrons 6) : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tels que $a \mid b$. Alors, il existe $h \in \mathbb{Z}$ tel
que $b = ha$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que
 $b = ha$ et $a = kb$ d'où $a = kha$ ainsi $hk = 1$ donc $h = \pm 1$ et par suite
 $a = \pm b$.
- Montrons 6) : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tels que $a \mid b$. Alors, il existe $h \in \mathbb{Z}$ tel
que $b = ha$ d'où $h \neq 0$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que
 $b = ha$ et $a = kb$ d'où $a = kha$ ainsi $hk = 1$ donc $h = \pm 1$ et par suite
 $a = \pm b$.
- Montrons 6) : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tels que $a \mid b$. Alors, il existe $h \in \mathbb{Z}$ tel
que $b = ha$ d'où $h \neq 0$ donc $|b| = |h||a| \geq |a|$ car $|h| \geq 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

Les propriétés 1), 4) et 5) sont évidentes.

- Montrons 2) : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm 1$, alors $a \mid 1$.
Réciproquement, supposons que $a \mid 1$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z} : 1 = ka$
d'où $1 = |k||a|$ ainsi $|a| \leq 1$; sinon, $|a| > 1$ et par suite
 $|k||a| > |k| \geq 1$. Alors, $|a| = 1$;
- Montrons 3) : Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Il est évident que si $a = \pm b$, alors $a \mid b$ et
 $b \mid a$. Réciproquement, supposons que $a \mid b$ et $b \mid a$. Si $a = 0$, alors
 $b = 0$ car $a \mid b$. Supposons que $a \neq 0$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que
 $b = ha$ et $a = kb$ d'où $a = kha$ ainsi $hk = 1$ donc $h = \pm 1$ et par suite
 $a = \pm b$.
- Montrons 6) : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tels que $a \mid b$. Alors, il existe $h \in \mathbb{Z}$ tel
que $b = ha$ d'où $h \neq 0$ donc $|b| = |h||a| \geq |a|$ car $|h| \geq 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

- Montrons 7) : Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $a \mid b$ et $a \mid c$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

- Montrons 7) : Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $a \mid b$ et $a \mid c$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ha$ et $c = ka$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

- Montrons 7) : Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $a \mid b$ et $a \mid c$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ha$ et $c = ka$ ainsi $\forall x, y \in \mathbb{Z}$,
 $bx + cy =$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

- Montrons 7) : Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $a \mid b$ et $a \mid c$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ha$ et $c = ka$ ainsi $\forall x, y \in \mathbb{Z}$,
 $bx + cy = xha + yka =$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

- Montrons 7) : Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $a \mid b$ et $a \mid c$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ha$ et $c = ka$ ainsi $\forall x, y \in \mathbb{Z}$,
 $bx + cy = xha + yka = (xh + yk)a$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Démonstration.

- Montrons 7) : Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $a \mid b$ et $a \mid c$. Alors, il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ha$ et $c = ka$ ainsi $\forall x, y \in \mathbb{Z}$,
 $bx + cy = xha + yka = (xh + yk)a$ et donc $a \mid bx + cy$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Remarque 2.8

La relation de divisibilité dans $\mathbb{Z}$ est réflexive

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Remarque 2.8

La relation de divisibilité dans $\mathbb{Z}$ est réflexive et transitive

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Relation de Divisibilité

Remarque 2.8

La relation de divisibilité dans $\mathbb{Z}$ est réflexive et transitive mais n'est pas antisymétrique.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.9

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.9

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Il existe un unique entier positif d tel que

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.9

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Il existe un unique entier positif d tel que

① $d \mid a$ et $d \mid b$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.9

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Il existe un unique entier positif d tel que

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que c divise a et c divise b , alors $c \leq d$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.9

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Il existe un unique entier positif d tel que

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que c divise a et c divise b , alors $c \leq d$.

L'entier naturel d est appelé **le plus grand commun diviseur** de a et b .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.9

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Il existe un unique entier positif d tel que

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que c divise a et c divise b , alors $c \leq d$.

L'entier naturel d est appelé **le plus grand commun diviseur** de a et b . d est noté $a \wedge b$ ou $d = \text{pgcd}(a, b)$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble
 $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble

$A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$),

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble
 $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même
si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et
 $|a| > 0$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble
 $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même
si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et
 $|a| > 0$ donc $|a| \in A$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd =$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) =$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$;

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$; sinon, $r \in A$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$; sinon, $r \in A$ et $r < d$ ce qui contredit le fait que d est le plus petit élément de A .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$; sinon, $r \in A$ et $r < d$ ce qui contredit le fait que d est le plus petit élément de A . Puisque $r = 0$, $a = qd$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$; sinon, $r \in A$ et $r < d$ ce qui contredit le fait que d est le plus petit élément de A . Puisque $r = 0$, $a = qd$ et donc $d \mid a$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$; sinon, $r \in A$ et $r < d$ ce qui contredit le fait que d est le plus petit élément de A . Puisque $r = 0$, $a = qd$ et donc $d \mid a$. De la même façon, on vérifie que $d \mid b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$; sinon, $r \in A$ et $r < d$ ce qui contredit le fait que d est le plus petit élément de A . Puisque $r = 0$, $a = qd$ et donc $d \mid a$. De la même façon, on vérifie que $d \mid b$.
Soit c un entier tel que c divise a et c divise b . Montrons que $c \leq d$:

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$; sinon, $r \in A$ et $r < d$ ce qui contredit le fait que d est le plus petit élément de A . Puisque $r = 0$, $a = qd$ et donc $d \mid a$. De la même façon, on vérifie que $d \mid b$.

Soit c un entier tel que c divise a et c divise b . Montrons que $c \leq d$: Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$, $c \mid au + bv = d$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On considère l'ensemble $A = \{ax + by / (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } ax + by > 0\}$. Supposons que $a \neq 0$ (de même si $b \neq 0$), alors $|a| = ax + b \cdot 0$ avec $x = 1$ si $a > 0$ et $x = -1$ si $a < 0$, et $|a| > 0$ donc $|a| \in A$ et ainsi $A \neq \emptyset$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, A possède un plus petit élément qu'on note d . Ainsi, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : d = au + bv > 0$.

Montrons que d vérifie les deux propriétés : On a $d \mid a$, en effet : d'après le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : a = qd + r$ avec $0 \leq r < |d| = d$. Puisque $r = a - qd = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + b(-qv)$, $r = 0$; sinon, $r \in A$ et $r < d$ ce qui contredit le fait que d est le plus petit élément de A . Puisque $r = 0$, $a = qd$ et donc $d \mid a$. De la même façon, on vérifie que $d \mid b$.
Soit c un entier tel que c divise a et c divise b . Montrons que $c \leq d$: Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$, $c \mid au + bv = d$ d'où $|c| \leq d$ et par suite $c \leq d$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Unicité : Soit $d, d' \in \mathbb{N}$ tels que d et d' vérifient les deux propriétés :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Unicité : Soit $d, d' \in \mathbb{N}$ tels que d et d' vérifient les deux propriétés : On a $d' \mid a$ et $d' \mid b$ (car d' vérifie 1))

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Unicité : Soit $d, d' \in \mathbb{N}$ tels que d et d' vérifient les deux propriétés : On a $d' \mid a$ et $d' \mid b$ (car d' vérifie 1)) d'où $d' \leq d$ (car d vérifie 2)).

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Unicité : Soit $d, d' \in \mathbb{N}$ tels que d et d' vérifient les deux propriétés : On a $d' \mid a$ et $d' \mid b$ (car d' vérifie 1)) d'où $d' \leq d$ (car d vérifie 2)). de la même façon, on montre que $d \leq d'$ et ainsi $d' = d$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Remarque 2.10

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Remarque 2.10

① Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$, alors il existe $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : a \wedge b = ax + by$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Remarque 2.10

- 1 Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$, alors il existe $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : a \wedge b = ax + by$.
- 2 Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$, alors $a \wedge b = |a| \wedge |b|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Remarque 2.10

- 1 Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$, alors il existe $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : a \wedge b = ax + by$.
- 2 Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$, alors $a \wedge b = |a| \wedge |b|$.
- 3 On vérifie que si a, b et c sont des entiers non nuls, alors $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Remarque 2.10

- 1 Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$, alors il existe $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : a \wedge b = ax + by$.
- 2 Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$, alors $a \wedge b = |a| \wedge |b|$.
- 3 On vérifie que si a, b et c sont des entiers non nuls, alors $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ et ainsi on peut généraliser, par récurrence, à un nombre fini quelconque d'entiers non nuls, i.e.,
$$a_1 \wedge \cdots \wedge a_n = (a_1 \wedge \cdots \wedge a_{n-1}) \wedge a_n.$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

① $d \mid a$ et $d \mid b$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. Supposons que $d = a \wedge b$. Alors, par définition, $d \mid a$ et $d \mid b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. Supposons que $d = a \wedge b$. Alors, par définition, $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit c un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Puisque $d = a \wedge b$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$. Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$,
 $c \mid au + bv = d$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. Supposons que $d = a \wedge b$. Alors, par définition, $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit c un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Puisque $d = a \wedge b$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$. Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$,
 $c \mid au + bv = d$.

Réciproquement, supposons que d vérifie 1) et 2).

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. Supposons que $d = a \wedge b$. Alors, par définition, $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit c un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Puisque $d = a \wedge b$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$. Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$,
 $c \mid au + bv = d$.

Réciproquement, supposons que d vérifie 1) et 2). On a $d \mid a$ et $d \mid b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. Supposons que $d = a \wedge b$. Alors, par définition, $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit c un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Puisque $d = a \wedge b$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$. Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$,
 $c \mid au + bv = d$.

Réciproquement, supposons que d vérifie 1) et 2). On a $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit $c \in \mathbb{Z}$ tel que $c \mid a$ et $c \mid b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. Supposons que $d = a \wedge b$. Alors, par définition, $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit c un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Puisque $d = a \wedge b$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$. Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$,
 $c \mid au + bv = d$.

Réciproquement, supposons que d vérifie 1) et 2). On a $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit $c \in \mathbb{Z}$ tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Alors, $c \mid d$ car d vérifie 2)

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. Supposons que $d = a \wedge b$. Alors, par définition, $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit c un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Puisque $d = a \wedge b$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$. Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$,
 $c \mid au + bv = d$.

Réciproquement, supposons que d vérifie 1) et 2). On a $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit $c \in \mathbb{Z}$ tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Alors, $c \mid d$ car d vérifie 2) et ainsi $|c| \leq |d| = d$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.11

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. $d = a \wedge b$ si, et seulement si,

- 1) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- 2) Si c est un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{N}$. Supposons que $d = a \wedge b$. Alors, par définition, $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit c un entier tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Puisque $d = a \wedge b$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$. Puisque $c \mid a$ et $c \mid b$,
 $c \mid au + bv = d$.

Réciproquement, supposons que d vérifie 1) et 2). On a $d \mid a$ et $d \mid b$. Soit $c \in \mathbb{Z}$ tel que $c \mid a$ et $c \mid b$. Alors, $c \mid d$ car d vérifie 2) et ainsi $|c| \leq |d| = d$ d'où $c \leq d$ et donc $d = a \wedge b$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Définition 2.12

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. On dit que a et b sont premiers entre eux si $a \wedge b = 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. Supposons que a et b sont premiers entre eux, i.e., $a \wedge b = 1$, alors il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. Supposons que a et b sont premiers entre eux, i.e., $a \wedge b = 1$, alors il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. Supposons que a et b sont premiers entre eux, i.e., $a \wedge b = 1$, alors il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Posons $d = a \wedge b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. Supposons que a et b sont premiers entre eux, i.e., $a \wedge b = 1$, alors il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Posons $d = a \wedge b$. Alors, $d \mid a$ et $d \mid b$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. Supposons que a et b sont premiers entre eux, i.e., $a \wedge b = 1$, alors il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Posons $d = a \wedge b$. Alors, $d \mid a$ et $d \mid b$ ainsi $d \mid ax + by = 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.13 (Théorème de Bézout)

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$. Supposons que a et b sont premiers entre eux, i.e., $a \wedge b = 1$, alors il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ax + by$.

Posons $d = a \wedge b$. Alors, $d \mid a$ et $d \mid b$ ainsi $d \mid ax + by = 1$ et donc $d = 1$ car $d \in \mathbb{N}^*$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.14

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Si $a \wedge b = d$, alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.14

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Si $a \wedge b = d$, alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\} : a \wedge b = d$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.14

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Si $a \wedge b = d$, alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\} : a \wedge b = d$. Alors, $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.14

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Si $a \wedge b = d$, alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\} : a \wedge b = d$. Alors, $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Puisque $a \wedge b = d$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.14

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Si $a \wedge b = d$, alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\} : a \wedge b = d$. Alors, $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Puisque $a \wedge b = d$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $d = au + bv$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.14

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Si $a \wedge b = d$, alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\} : a \wedge b = d$. Alors, $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Puisque $a \wedge b = d$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $d = au + bv$ ainsi $1 = \frac{a}{d} \cdot u + \frac{b}{d} v$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.14

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Si $a \wedge b = d$, alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$.

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\} : a \wedge b = d$. Alors, $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) \in \mathbb{Z}^2 - \{(0, 0)\}$. Puisque $a \wedge b = d$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $d = au + bv$ ainsi $1 = \frac{a}{d} \cdot u + \frac{b}{d} v$ et donc $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = c(au) + c(bv)$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = c(au) + c(bv)$. On a aussi $a \mid c$ et $b \mid c$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = c(au) + c(bv)$. On a aussi $a \mid c$ et $b \mid c$ d'où il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tel que $c = ha$ et $c = kb$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = c(au) + c(bv)$. On a aussi $a \mid c$ et $b \mid c$ d'où il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tel que $c = ha$ et $c = kb$ ainsi $c = c(au) + c(bv)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = c(au) + c(bv)$. On a aussi $a \mid c$ et $b \mid c$ d'où il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tel que $c = ha$ et $c = kb$ ainsi $c = c(au) + c(bv) = kb(au) + ha(bv)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = c(au) + c(bv)$. On a aussi $a \mid c$ et $b \mid c$ d'où il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tel que $c = ha$ et $c = kb$ ainsi $c = c(au) + c(bv) = kb(au) + ha(bv) = ab(ku + hv)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.15

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$ et $b \mid c$. Si $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$. Puisque $a \wedge b = 1$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = c(au) + c(bv)$. On a aussi $a \mid c$ et $b \mid c$ d'où il existe $h, k \in \mathbb{Z}$ tel que $c = ha$ et $c = kb$ ainsi $c = c(au) + c(bv) = kb(au) + ha(bv) = ab(ku + hv)$ et donc $ab \mid c$. $\square$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.16 (Lemme de Gauss)

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.16 (Lemme de Gauss)

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Si $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.16 (Lemme de Gauss)

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Si $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.16 (Lemme de Gauss)

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Si $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Supposons que $a \wedge b = 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.16 (Lemme de Gauss)

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Si $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Supposons que $a \wedge b = 1$. Alors, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.16 (Lemme de Gauss)

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Si $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Supposons que $a \wedge b = 1$. Alors, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = (ac)u + (bc)v$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.16 (Lemme de Gauss)

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Si $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration.

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid bc$. Supposons que $a \wedge b = 1$. Alors, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$ d'où $c = (ac)u + (bc)v$. Comme $a \mid ac$ et $a \mid bc$, $a \mid (ac)u + (bc)v = c$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$. Posons $d_1 = a \wedge b$ et $d_2 = b \wedge r$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$. Posons $d_1 = a \wedge b$ et $d_2 = b \wedge r$. Puisque $d_1 \mid a$ et $d_1 \mid b$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$. Posons $d_1 = a \wedge b$ et $d_2 = b \wedge r$. Puisque $d_1 \mid a$ et $d_1 \mid b$, $d_1 \mid a - qb = r$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$. Posons $d_1 = a \wedge b$ et $d_2 = b \wedge r$. Puisque $d_1 \mid a$ et $d_1 \mid b$, $d_1 \mid a - qb = r$ d'où $d_1 \mid d_2$ car $d_1 \mid b$ et $d_1 \mid r$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$. Posons $d_1 = a \wedge b$ et $d_2 = b \wedge r$. Puisque $d_1 \mid a$ et $d_1 \mid b$, $d_1 \mid a - qb = r$ d'où $d_1 \mid d_2$ car $d_1 \mid b$ et $d_1 \mid r$. Aussi, Puisque $d_2 \mid b$ et $d_2 \mid r$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$. Posons $d_1 = a \wedge b$ et $d_2 = b \wedge r$. Puisque $d_1 \mid a$ et $d_1 \mid b$, $d_1 \mid a - qb = r$ d'où $d_1 \mid d_2$ car $d_1 \mid b$ et $d_1 \mid r$. Aussi, Puisque $d_2 \mid b$ et $d_2 \mid r$, $d_2 \mid qb + r = a$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$. Posons $d_1 = a \wedge b$ et $d_2 = b \wedge r$. Puisque $d_1 \mid a$ et $d_1 \mid b$, $d_1 \mid a - qb = r$ d'où $d_1 \mid d_2$ car $d_1 \mid b$ et $d_1 \mid r$. Aussi, Puisque $d_2 \mid b$ et $d_2 \mid r$, $d_2 \mid qb + r = a$ d'où $d_2 \mid d_1$ car $d_2 \mid a$ et $d_2 \mid b$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Lemme 2.17

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Si $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$, alors $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = qb + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$. Posons $d_1 = a \wedge b$ et $d_2 = b \wedge r$. Puisque $d_1 \mid a$ et $d_1 \mid b$, $d_1 \mid a - qb = r$ d'où $d_1 \mid d_2$ car $d_1 \mid b$ et $d_1 \mid r$. Aussi, Puisque $d_2 \mid b$ et $d_2 \mid r$, $d_2 \mid qb + r = a$ d'où $d_2 \mid d_1$ car $d_2 \mid a$ et $d_2 \mid b$ et donc $d_1 = d_2$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^$.*

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^$. On peut supposer que $0 < b \leq a$.*

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. On peut supposer que $0 < b \leq a$. On a $a = q_1 b + r_1$, avec $0 \leq r_1 < b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. On peut supposer que $0 < b \leq a$. On a $a = q_1 b + r_1$, avec $0 \leq r_1 < b$. Si $r_1 = 0$, alors $a \wedge b = b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. On peut supposer que $0 < b \leq a$. On a $a = q_1 b + r_1$, avec $0 \leq r_1 < b$. Si $r_1 = 0$, alors $a \wedge b = b$. Si $r_1 \neq 0$, $b = q_2 r_1 + r_2$, avec $0 \leq r_2 < r_1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. On peut supposer que $0 < b \leq a$. On a $a = q_1 b + r_1$, avec $0 \leq r_1 < b$. Si $r_1 = 0$, alors $a \wedge b = b$. Si $r_1 \neq 0$, $b = q_2 r_1 + r_2$, avec $0 \leq r_2 < r_1$. Si $r_2 = 0$, alors $a \wedge b = b \wedge r_1 = r_1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. On peut supposer que $0 < b \leq a$. On a $a = q_1 b + r_1$, avec $0 \leq r_1 < b$. Si $r_1 = 0$, alors $a \wedge b = b$. Si $r_1 \neq 0$, $b = q_2 r_1 + r_2$, avec $0 \leq r_2 < r_1$. Si $r_2 = 0$, alors $a \wedge b = b \wedge r_1 = r_1$. Si $r_2 \neq 0$,

$$a = bq + r_1, \text{ avec } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2 r_1 + r_2, \text{ avec } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3, \text{ avec } 0 \leq r_3 < r_2$$

$\vdots$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. On peut supposer que $0 < b \leq a$. On a $a = q_1 b + r_1$, avec $0 \leq r_1 < b$. Si $r_1 = 0$, alors $a \wedge b = b$. Si $r_1 \neq 0$, $b = q_2 r_1 + r_2$, avec $0 \leq r_2 < r_1$. Si $r_2 = 0$, alors $a \wedge b = b \wedge r_1 = r_1$. Si $r_2 \neq 0$,

$$a = bq + r_1, \text{ avec } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2 r_1 + r_2, \text{ avec } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3, \text{ avec } 0 \leq r_3 < r_2$$

$\vdots$

Puisque $b > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ et que $b, r_1, r_2, \dots \in \mathbb{N}$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. On peut supposer que $0 < b \leq a$. On a $a = q_1 b + r_1$, avec $0 \leq r_1 < b$. Si $r_1 = 0$, alors $a \wedge b = b$. Si $r_1 \neq 0$, $b = q_2 r_1 + r_2$, avec $0 \leq r_2 < r_1$. Si $r_2 = 0$, alors $a \wedge b = b \wedge r_1 = r_1$. Si $r_2 \neq 0$,

$$\begin{aligned}a &= bq + r_1, \text{ avec } 0 \leq r_1 < b \\b &= q_2 r_1 + r_2, \text{ avec } 0 \leq r_2 < r_1 \\r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \text{ avec } 0 \leq r_3 < r_2 \\&\vdots\end{aligned}$$

Puisque $b > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ et que $b, r_1, r_2, \dots \in \mathbb{N}$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n$, avec $0 < r_n < r_{n-1}$ et $r_{n-1} = q_{n+1} r_n$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.18 (Algorithme d'Euclide)

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. On peut supposer que $0 < b \leq a$. On a $a = q_1 b + r_1$, avec $0 \leq r_1 < b$. Si $r_1 = 0$, alors $a \wedge b = b$. Si $r_1 \neq 0$, $b = q_2 r_1 + r_2$, avec $0 \leq r_2 < r_1$. Si $r_2 = 0$, alors $a \wedge b = b \wedge r_1 = r_1$. Si $r_2 \neq 0$,

$$a = bq + r_1, \text{ avec } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2 r_1 + r_2, \text{ avec } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3, \text{ avec } 0 \leq r_3 < r_2$$

$\vdots$

Puisque $b > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ et que $b, r_1, r_2, \dots \in \mathbb{N}$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n$, avec $0 < r_n < r_{n-1}$ et $r_{n-1} = q_{n+1} r_n$. Ainsi, on a $a \wedge b = b \wedge r_1 = r_1 \wedge r_2 = \dots = r_{n-1} \wedge r_n = r_n$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Exemple 2.19

En utilisant l'algorithme d'Euclide pour calculer $1008 \wedge 360$, on obtient :
 $1008 = 2 \cdot 360 + 288,$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Exemple 2.19

En utilisant l'algorithme d'Euclide pour calculer $1008 \wedge 360$, on obtient :
 $1008 = 2 \cdot 360 + 288$, $360 = 288 + 72$, ,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Exemple 2.19

En utilisant l'algorithme d'Euclide pour calculer $1008 \wedge 360$, on obtient :
 $1008 = 2 \cdot 360 + 288$, $360 = 288 \cdot 1 + 72$, $288 = 72 \cdot 4$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Exemple 2.19

En utilisant l'algorithme d'Euclide pour calculer $1008 \wedge 360$, on obtient :
 $1008 = 2 \cdot 360 + 288$, $360 = 288 \cdot 1 + 72$, , $288 = 72 \cdot 4$, ainsi
 $1008 \wedge 360 = 72$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$:

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$: on part de $d = r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$: on part de $d = r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$, puis on exprime d comme combinaison de r_{n-2} et r_{n-3} ,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$: on part de $d = r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$, puis on exprime d comme combinaison de r_{n-2} et r_{n-3} , et en remontant de bas en haut, on écrit d comme combinaison de b et r_1 ,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$: on part de $d = r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$, puis on exprime d comme combinaison de r_{n-2} et r_{n-3} , et en remontant de bas en haut, on écrit d comme combinaison de b et r_1 , et ainsi on obtient d sous la forme $d = au + bv$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$: on part de $d = r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$, puis on exprime d comme combinaison de r_{n-2} et r_{n-3} , et en remontant de bas en haut, on écrit d comme combinaison de b et r_1 , et ainsi on obtient d sous la forme $d = au + bv$.

Exemple 2.21

On a $1008 \wedge 360 = 72$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$: on part de $d = r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$, puis on exprime d comme combinaison de r_{n-2} et r_{n-3} , et en remontant de bas en haut, on écrit d comme combinaison de b et r_1 , et ainsi on obtient d sous la forme $d = au + bv$.

Exemple 2.21

On a $1008 \wedge 360 = 72$, et $1008 = 2.360 + 288$, $360 = 288.1 + 72$, $288 = 72.4$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$: on part de $d = r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$, puis on exprime d comme combinaison de r_{n-2} et r_{n-3} , et en remontant de bas en haut, on écrit d comme combinaison de b et r_1 , et ainsi on obtient d sous la forme $d = au + bv$.

Exemple 2.21

On a $1008 \wedge 360 = 72$, et $1008 = 2.360 + 288$, $360 = 288.1 + 72$, $288 = 72.4$. Alors, $72 = 360 - 288.1 = 360 - (1008 - 2.360)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Algorithme 2.20 (Algorithme d'Euclide étendu)

Soit a et b deux entiers et $d = a \wedge b$. , L'algorithme suivant permet d'écrire d comme combinaison de a et b , i.e., trouver $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$: on part de $d = r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$, puis on exprime d comme combinaison de r_{n-2} et r_{n-3} , et en remontant de bas en haut, on écrit d comme combinaison de b et r_1 , et ainsi on obtient d sous la forme $d = au + bv$.

Exemple 2.21

On a $1008 \wedge 360 = 72$, et $1008 = 2.360 + 288$, $360 = 288.1 + 72$, $288 = 72.4$. Alors, $72 = 360 - 288.1 = 360 - (1008 - 2.360)$ ainsi $72 = (-1).1008 + 3.360$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.22

Si k est un entier non nul, alors $\text{pgcd}(ka, kb) = |k|\text{pgcd}(a, b)$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.22

Si k est un entier non nul, alors $\text{pgcd}(ka, kb) = |k|\text{pgcd}(a, b)$.

Démonstration.

Puisque $\text{pgcd}(ka, kb) = \text{pgcd}(|ka|, |kb|) = \text{pgcd}(|k||a|, |k||b|)$, on peut supposer que $k, a, b \in \mathbb{N}^*$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Corollaire 2.22

Si k est un entier non nul, alors $\text{pgcd}(ka, kb) = |k|\text{pgcd}(a, b)$.

Démonstration.

Puisque $\text{pgcd}(ka, kb) = \text{pgcd}(|ka|, |kb|) = \text{pgcd}(|k||a|, |k||b|)$, on peut supposer que $k, a, b \in \mathbb{N}^*$. Posons $\text{pgcd}(a, b) = r_n$ obtenu à l'aide de l'algorithme d'Euclide :

$$a = bq + r_1, \text{ avec } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2r_1 + r_2, \text{ avec } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3r_2 + r_3, \text{ avec } 0 \leq r_3 < r_2$$

$\vdots$

$$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n \text{ avec } 0 \leq r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = q_{n+1} r_n$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Alors,

$$ka = kbq + kr_1, \text{ avec } 0 \leq kr_1 < kb$$

$$kb = q_2kr_1 + kr_2, \text{ avec } 0 \leq kr_2 < kr_1$$

$$kr_1 = q_3kr_2 + kr_3, \text{ avec } 0 \leq kr_3 < kr_2$$

$\vdots$

$$kr_{n-2} = q_nkr_{n-1} + kr_n \text{ avec } 0 \leq kr_n < kr_{n-1}$$

$$kr_{n-1} = q_{n+1}kr_n$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Alors,

$$ka = kbq + kr_1, \text{ avec } 0 \leq kr_1 < kb$$

$$kb = q_2kr_1 + kr_2, \text{ avec } 0 \leq kr_2 < kr_1$$

$$kr_1 = q_3kr_2 + kr_3, \text{ avec } 0 \leq kr_3 < kr_2$$

$\vdots$

$$kr_{n-2} = q_nkr_{n-1} + kr_n \text{ avec } 0 \leq kr_n < kr_{n-1}$$

$$kr_{n-1} = q_{n+1}kr_n$$

et ainsi on obtient l'algorithme d'Euclide appliqué aux entiers ak et bk et $\text{pgcd}(ak, bk)$ est le dernier reste non nul, i.e., $kr_n = k.\text{pgcd}(a, b)$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.23

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^$. Il existe un unique entier positif m tel que*

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.23

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^*$. Il existe un unique entier positif m tel que

① $a \mid m$ et $b \mid m$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.23

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^*$. Il existe un unique entier positif m tel que

- i) $a \mid m$ et $b \mid m$,
- ii) Si c est un entier tel que a divise c et b divise c , alors m divise c .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.23

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^*$. Il existe un unique entier positif m tel que

- i) $a \mid m$ et $b \mid m$,
- ii) Si c est un entier tel que a divise c et b divise c , alors m divise c .

L'entier naturel m est appelé **le plus petit commun multiple** de a et b .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème et définition 2.23

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^*$. Il existe un unique entier positif m tel que

- (i) $a \mid m$ et $b \mid m$,
- (ii) Si c est un entier tel que a divise c et b divise c , alors m divise c .

L'entier naturel m est appelé **le plus petit commun multiple** de a et b . m est noté $a \vee b$ ou $m = \text{ppcm}(a, b)$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m . Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m .

Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m . Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c . En effectuant la division euclidienne de c par m , il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : c = mq + r$, avec $0 \leq r < m$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m .

Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c . En effectuant la division euclidienne de c par m , il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : c = mq + r$, avec $0 \leq r < m$.

Puisque $a \mid c$ et $a \mid m$, $a \mid r$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m .

Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c . En effectuant la division euclidienne de c par m , il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : c = mq + r$, avec $0 \leq r < m$.

Puisque $a \mid c$ et $a \mid m$, $a \mid r$. Aussi, puisque $b \mid c$ et $b \mid m$, $b \mid r$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m .

Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c . En effectuant la division euclidienne de c par m , il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : c = mq + r$, avec $0 \leq r < m$.

Puisque $a \mid c$ et $a \mid m$, $a \mid r$. Aussi, puisque $b \mid c$ et $b \mid m$, $b \mid r$. Alors, $r = 0$, sinon, $r \in A$ et $r < m$, contradiction, et donc $m \mid c$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m . Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c . En effectuant la division euclidienne de c par m , il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : c = mq + r$, avec $0 \leq r < m$. Puisque $a \mid c$ et $a \mid m$, $a \mid r$. Aussi, puisque $b \mid c$ et $b \mid m$, $b \mid r$. Alors, $r = 0$, sinon, $r \in A$ et $r < m$, contradiction, et donc $m \mid c$.

Unicité : Supposons que m_1 et m_2 sont des ppcm de a et b .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m . Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c . En effectuant la division euclidienne de c par m , il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : c = mq + r$, avec $0 \leq r < m$. Puisque $a \mid c$ et $a \mid m$, $a \mid r$. Aussi, puisque $b \mid c$ et $b \mid m$, $b \mid r$. Alors, $r = 0$, sinon, $r \in A$ et $r < m$, contradiction, et donc $m \mid c$.

Unicité : Supposons que m_1 et m_2 sont des ppcm de a et b . On a $a \mid m_1$ et $b \mid m_1$ d'où $m_2 \mid m_1$ car m_2 est un ppcm de a et b .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m . Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c . En effectuant la division euclidienne de c par m , il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : c = mq + r$, avec $0 \leq r < m$. Puisque $a \mid c$ et $a \mid m$, $a \mid r$. Aussi, puisque $b \mid c$ et $b \mid m$, $b \mid r$. Alors, $r = 0$, sinon, $r \in A$ et $r < m$, contradiction, et donc $m \mid c$.

Unicité : Supposons que m_1 et m_2 sont des ppcm de a et b . On a $a \mid m_1$ et $b \mid m_1$ d'où $m_2 \mid m_1$ car m_2 est un ppcm de a et b . Aussi, on a $a \mid m_2$ et $b \mid m_2$ d'où $m_1 \mid m_2$ car m_1 est un ppcm de a et b .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Démonstration.

Existence : On considère $A = \{x \in \mathbb{N}^* / a \mid x \text{ et } b \mid x\}$, i.e., l'ensemble des multiples communs positifs de a et b . On a A est une partie de $\mathbb{N}$ et A est non vide car $|ab| \in A$ d'où A possède un plus petit élément qu'on note m . Alors, $m \in \mathbb{N}^*$, $a \mid m$ et $b \mid m$.

Soit c un entier tel que a divise c et b divise c . En effectuant la division euclidienne de c par m , il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : c = mq + r$, avec $0 \leq r < m$. Puisque $a \mid c$ et $a \mid m$, $a \mid r$. Aussi, puisque $b \mid c$ et $b \mid m$, $b \mid r$. Alors, $r = 0$, sinon, $r \in A$ et $r < m$, contradiction, et donc $m \mid c$.

Unicité : Supposons que m_1 et m_2 sont des ppcm de a et b . On a $a \mid m_1$ et $b \mid m_1$ d'où $m_2 \mid m_1$ car m_2 est un ppcm de a et b . Aussi, on a $a \mid m_2$ et $b \mid m_2$ d'où $m_1 \mid m_2$ car m_1 est un ppcm de a et b et ainsi puisque $m_2 \mid m_1$, $m_1 \mid m_2$ et $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$, $m_1 = m_2$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Remarques 2.24

- 1 On vérifie facilement que $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Remarques 2.24

- 1 On vérifie facilement que $ppcm(a, b) = ppcm(|a|, |b|)$.
- 2 On vérifie que si a, b et c sont des entiers non nuls, alors $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Remarques 2.24

- 1 On vérifie facilement que $ppcm(a, b) = ppcm(|a|, |b|)$.
- 2 On vérifie que si a, b et c sont des entiers non nuls, alors $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$ et ainsi on peut généraliser, par récurrence, à un nombre fini quelconque d'entiers non nuls, i.e.,
$$a_1 \vee \cdots \vee a_n = (a_1 \vee \cdots \vee a_{n-1}) \vee a_n.$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$:

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$ ainsi

$$\frac{c}{\frac{ab}{d}} =$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$ ainsi

$$\frac{c}{\frac{ab}{d}} = \frac{cd}{ab} =$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$ ainsi

$$\frac{c}{\frac{ab}{d}} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(au+bv)}{ab} =$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$ ainsi

$$\frac{c}{\frac{ab}{d}} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(au+bv)}{ab} = \frac{cau}{ab} + \frac{cbv}{ab} =$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$ ainsi

$$\frac{c}{\frac{ab}{d}} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(au+bv)}{ab} = \frac{cau}{ab} + \frac{cbv}{ab} = \frac{c}{b}u + \frac{c}{a}v =$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$ ainsi

$$\frac{c}{\frac{ab}{d}} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(au+bv)}{ab} = \frac{cau}{ab} + \frac{cbv}{ab} = \frac{c}{b}u + \frac{c}{a}v = ku + hv \in \mathbb{Z} \text{ d'où}$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$ ainsi

$$\frac{c}{\frac{ab}{d}} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(au+bv)}{ab} = \frac{cau}{ab} + \frac{cbv}{ab} = \frac{c}{b}u + \frac{c}{a}v = ku + hv \in \mathbb{Z} \text{ d'où } \frac{ab}{d} \mid c$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Pgcd et Ppcm

Théorème 2.25

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Alors, $\text{pgcd}(a, b)\text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration.

Soit $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$ et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$, on peut supposer que $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et montrons que $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$: D'abord, il est évident que puisque $d \mid a$, $\frac{ab}{d}$ est un entier. On a $a = da'$ et $b = db'$ avec $a', b' \in \mathbb{Z}$. Alors, $\frac{ab}{d} = a'b = b'a$ d'où $\frac{ab}{d}$ est un multiple commun positif de a et b .

Soit $c \in \mathbb{Z} : a \mid c$ et $b \mid c$. Alors, $c = ah$ et $c = bk$, où $h, k \in \mathbb{Z}$. Puisque $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : d = au + bv$ ainsi

$$\frac{c}{\frac{ab}{d}} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(au+bv)}{ab} = \frac{cau}{ab} + \frac{cbv}{ab} = \frac{c}{b}u + \frac{c}{a}v = ku + hv \in \mathbb{Z} \text{ d'où } \frac{ab}{d} \mid c \text{ et}$$

donc $\frac{ab}{d} = \text{ppcm}(a, b)$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Définition 2.26

Soit $p > 1$ un entier.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Définition 2.26

Soit $p > 1$ un entier. On dit que p est **premier**

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Définition 2.26

Soit $p > 1$ un entier. On dit que p est **premier** si les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Définition 2.26

Soit $p > 1$ un entier. On dit que p est **premier** si les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p . Un entier > 1 qui n'est pas premier est dit **composé**.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.27

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.27

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.27

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Démonstration.

On a $p \wedge a \in \{1, p\}$ car $p \wedge a$ est un diviseur positif de p et p est premier.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.27

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Démonstration.

On a $p \wedge a \in \{1, p\}$ car $p \wedge a$ est un diviseur positif de p et p est premier.
Si $p \wedge a = p$, alors $p \mid a$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.27

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Démonstration.

On a $p \wedge a \in \{1, p\}$ car $p \wedge a$ est un diviseur positif de p et p est premier.

Si $p \wedge a = p$, alors $p \mid a$.

Si $p \wedge a = 1$, alors, d'après le lemme de Gauss, $p \mid b$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 *Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.*
- 2 *Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.*

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 *Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.*
- 2 *Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.*

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
- 2 Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) : Pour un entier $n \geq 2$, on note $P(n)$: Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
- 2 Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) : Pour un entier $n \geq 2$, on note $P(n)$: Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
D'après le théorème précédent, $P(2)$ est vraie.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
- 2 Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) : Pour un entier $n \geq 2$, on note $P(n)$: Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
D'après le théorème précédent, $P(2)$ est vraie. Supposons que $P(n)$ est vraie à un rang $n \geq 2$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
- 2 Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) : Pour un entier $n \geq 2$, on note $P(n)$: Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
D'après le théorème précédent, $P(2)$ est vraie. Supposons que $P(n)$ est vraie à un rang $n \geq 2$. Soit p un nombre premier tel que $p \mid a_1 \dots a_n \cdot a_{n+1}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
- 2 Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) : Pour un entier $n \geq 2$, on note $P(n)$: Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
D'après le théorème précédent, $P(2)$ est vraie. Supposons que $P(n)$ est vraie à un rang $n \geq 2$. Soit p un nombre premier tel que $p \mid a_1 \dots a_n \cdot a_{n+1}$. Alors, $p \mid (a_1 \dots a_n) \cdot a_{n+1}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
- 2 Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) : Pour un entier $n \geq 2$, on note $P(n)$: Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
D'après le théorème précédent, $P(2)$ est vraie. Supposons que $P(n)$ est vraie à un rang $n \geq 2$. Soit p un nombre premier tel que $p \mid a_1 \dots a_n \cdot a_{n+1}$. Alors, $p \mid (a_1 \dots a_n) \cdot a_{n+1}$ d'où $p \mid a_1 \dots a_n$ ou $p \mid a_{n+1}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
- 2 Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) : Pour un entier $n \geq 2$, on note $P(n)$: Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
D'après le théorème précédent, $P(2)$ est vraie. Supposons que $P(n)$ est vraie à un rang $n \geq 2$. Soit p un nombre premier tel que $p \mid a_1 \dots a_n \cdot a_{n+1}$. Alors, $p \mid (a_1 \dots a_n) \cdot a_{n+1}$ d'où $p \mid a_1 \dots a_n$ ou $p \mid a_{n+1}$ ainsi il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$ ou $p \mid a_{n+1}$ car $P(n)$ est vraie

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Corollaire 2.28

Soit p un nombre premier.

- 1 Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
- 2 Soit $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers. Si $p \mid p_1 \dots p_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p = p_k$.

Démonstration.

- Montrons par récurrence 1) : Pour un entier $n \geq 2$, on note $P(n)$: Si $p \mid a_1 \dots a_n$, alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$.
D'après le théorème précédent, $P(2)$ est vraie. Supposons que $P(n)$ est vraie à un rang $n \geq 2$. Soit p un nombre premier tel que $p \mid a_1 \dots a_n \cdot a_{n+1}$. Alors, $p \mid (a_1 \dots a_n) \cdot a_{n+1}$ d'où $p \mid a_1 \dots a_n$ ou $p \mid a_{n+1}$ ainsi il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid a_k$ ou $p \mid a_{n+1}$ car $P(n)$ est vraie et donc il existe $k \in \{1, \dots, n, n+1\}$ tel que $p \mid a_k$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

- Soit $p, p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers tels que $p \mid p_1 \dots p_n$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

- Soit $p, p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers tels que $p \mid p_1 \dots p_n$. D'après 1), il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid p_k$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

- Soit $p, p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers tels que $p \mid p_1 \dots p_n$. D'après 1), il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $p \mid p_k$ d'où $p = p_k$ car p_k est premier et p est un diviseur positif différent de 1 de p_k .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.29 (Théorème fondamental d'arithmétique)

Si $n > 1$ est un entier, alors n s'écrit d'une manière unique sous la forme $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^$, p_i est premier et $p_1 < p_2 < \dots < p_r$.*

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément n .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément n . On a n est composé, sinon $n = n$ se décompose en produit de nombres premiers et donc $n \notin A$, ce qui est faux.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément n . On a n est composé, sinon $n = n$ se décompose en produit de nombres premiers et donc $n \notin A$, ce qui est faux. Puisque n est composé, $n = ab$, avec a, b des entiers tels que $1 < a < n$ et $1 < b < n$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément n . On a n est composé, sinon $n = n$ se décompose en produit de nombres premiers et donc $n \notin A$, ce qui est faux. Puisque n est composé, $n = ab$, avec a, b des entiers tels que $1 < a < n$ et $1 < b < n$ d'où a et b se décomposent en des produit de nombres premiers

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément n . On a n est composé, sinon $n = n$ se décompose en produit de nombres premiers et donc $n \notin A$, ce qui est faux. Puisque n est composé, $n = ab$, avec a, b des entiers tels que $1 < a < n$ et $1 < b < n$ d'où a et b se décomposent en des produit de nombres premiers et par suite n se décompose aussi en un produit de nombres premiers, contradiction.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément n . On a n est composé, sinon $n = n$ se décompose en produit de nombres premiers et donc $n \notin A$, ce qui est faux. Puisque n est composé, $n = ab$, avec a, b des entiers tels que $1 < a < n$ et $1 < b < n$ d'où a et b se décomposent en des produit de nombres premiers et par suite n se décompose aussi en un produit de nombres premiers, contradiction.

Soit n un entier > 1 . Plusieurs des nombres premiers qui apparaissent dans la décomposition de n en produit de nombres premiers peuvent être égaux.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément n . On a n est composé, sinon $n = n$ se décompose en produit de nombres premiers et donc $n \notin A$, ce qui est faux. Puisque n est composé, $n = ab$, avec a, b des entiers tels que $1 < a < n$ et $1 < b < n$ d'où a et b se décomposent en des produit de nombres premiers et par suite n se décompose aussi en un produit de nombres premiers, contradiction.

Soit n un entier > 1 . Plusieurs des nombres premiers qui apparaissent dans la décomposition de n en produit de nombres premiers peuvent être égaux. Dans ce cas, on remplace les produit de ces nombres premiers égaux (à p) par p^α

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Existence : Montrons d'abord que tout entier $n > 1$ se décompose en un produit de nombres premiers : Procédons par absurde et supposons qu'il existe un entier > 1 qui n'est pas un produit de nombre premiers. On considère l'ensemble A des entiers > 1 qui ne sont pas des produits de nombres premiers. Alors, A est un partie non vide de $\mathbb{N}$ d'où A possède un plus petit élément n . On a n est composé, sinon $n = n$ se décompose en produit de nombres premiers et donc $n \notin A$, ce qui est faux. Puisque n est composé, $n = ab$, avec a, b des entiers tels que $1 < a < n$ et $1 < b < n$ d'où a et b se décomposent en des produit de nombres premiers et par suite n se décompose aussi en un produit de nombres premiers, contradiction.

Soit n un entier > 1 . Plusieurs des nombres premiers qui apparaissent dans la décomposition de n en produit de nombres premiers peuvent être égaux.

Dans ce cas, on remplace les produit de ces nombres premiers égaux (à p) par p^α et ainsi $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier et $p_1 < p_2 < \dots < p_r$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$:

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$).

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$ et ainsi $p_1 \nmid q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s} = n$, contradiction.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$ et ainsi $p_1 \nmid q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s} = n$, contradiction.

On a $k_1 = h_1$:

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$ et ainsi $p_1 \nmid q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s} = n$, contradiction.

On a $k_1 = h_1$: en effet, supposons que $k_1 < h_1$ (de même si $h_1 < k_1$).

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$ et ainsi $p_1 \nmid q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s} = n$, contradiction.

On a $k_1 = h_1$: en effet, supposons que $k_1 < h_1$ (de même si $h_1 < k_1$). Alors, $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1 - k_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$ et ainsi $p_1 \nmid q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s} = n$, contradiction.

On a $k_1 = h_1$: en effet, supposons que $k_1 < h_1$ (de même si $h_1 < k_1$). Alors, $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1 - k_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$ ainsi $q_1 = p_1$ divise $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$ et ainsi $p_1 \nmid q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s} = n$, contradiction.

On a $k_1 = h_1$: en effet, supposons que $k_1 < h_1$ (de même si $h_1 < k_1$). Alors, $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1 - k_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$ ainsi $q_1 = p_1$ divise $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$ d'où il existe $i \in \{2, \dots, r\}$ tel que $p_1 = p_i$, contradiction car $p_1 < p_i, \forall i \in \{2, \dots, r\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$ et ainsi $p_1 \nmid q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s} = n$, contradiction.

On a $k_1 = h_1$: en effet, supposons que $k_1 < h_1$ (de même si $h_1 < k_1$). Alors, $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1 - k_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$ ainsi $q_1 = p_1$ divise $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$ d'où il existe $i \in \{2, \dots, r\}$ tel que $p_1 = p_i$, contradiction car $p_1 < p_i, \forall i \in \{2, \dots, r\}$.

Puisque $p_1 = q_1$ et $k_1 = h_1$, $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Démonstration.

Unicité : Soit n un entier > 1 tel que $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$, avec pour tout $i = 1, \dots, r$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, p_i est premier, $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ et pour tout $i = 1, \dots, s$, $h_i \in \mathbb{N}^*$, q_i est premier $q_1 < q_2 < \dots < q_s$.

On a $p_1 = q_1$: en effet, supposons que $p_1 < q_1$ (de même si $q_1 < p_1$). Alors, $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 < q_i$ d'où $\forall i = 1, \dots, s$, $p_1 \nmid q_i$ et ainsi $p_1 \nmid q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s} = n$, contradiction.

On a $k_1 = h_1$: en effet, supposons que $k_1 < h_1$ (de même si $h_1 < k_1$). Alors, $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_1^{h_1 - k_1} q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$ ainsi $q_1 = p_1$ divise $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$ d'où il existe $i \in \{2, \dots, r\}$ tel que $p_1 = p_i$, contradiction car $p_1 < p_i, \forall i \in \{2, \dots, r\}$.

Puisque $p_1 = q_1$ et $k_1 = h_1$, $p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} = q_2^{h_2} \dots q_s^{h_s}$. En procédant de la même façon que précédemment, on montre que $p_2 = q_2, h_2 = k_2, \dots, p_r = q_r, h_r = k_r$ et $r = s$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.30 (Théorème d'Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.30 (Théorème d'Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration.

Supposons qu'on a un nombre fini de nombres premiers et notons $p_1, \dots, p_n$ ces nombres premiers.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.30 (Théorème d'Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration.

Supposons qu'on a un nombre fini de nombres premiers et notons $p_1, \dots, p_n$ ces nombres premiers. On considère l'entier $N = p_1 p_2 \dots p_n + 1$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.30 (Théorème d'Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration.

Supposons qu'on a un nombre fini de nombres premiers et notons $p_1, \dots, p_n$ ces nombres premiers. On considère l'entier $N = p_1 p_2 \dots p_n + 1$. On a $N > 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.30 (Théorème d'Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration.

Supposons qu'on a un nombre fini de nombres premiers et notons $p_1, \dots, p_n$ ces nombres premiers. On considère l'entier $N = p_1 p_2 \dots p_n + 1$. On a $N > 1$ d'où, d'après le théorème précédent, il existe $p_i \in \{p_1, \dots, p_n\} : p_i \mid N$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Nombres premiers

Théorème 2.30 (Théorème d'Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration.

Supposons qu'on a un nombre fini de nombres premiers et notons $p_1, \dots, p_n$ ces nombres premiers. On considère l'entier $N = p_1 p_2 \dots p_n + 1$. On a $N > 1$ d'où, d'après le théorème précédent, il existe $p_i \in \{p_1, \dots, p_n\} : p_i \mid N$.

Comme $p_i \mid N$ et $p_i \mid p_1 p_2 \dots p_n$, $p_i \mid 1$, contradiction. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Définition 2.31

Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que deux entiers relatifs a et b sont congrus modulo n et on note $a \equiv b \pmod{n}$ si n divise $a - b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Définition 2.31

Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que deux entiers relatifs a et b sont congrus modulo n et on note $a \equiv b \pmod{n}$ si n divise $a - b$. La relation $a \equiv b \pmod{n}$ est appelée **congruence modulo n** .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarque 2.32

Si $n = 0$, la relation $a \equiv b \pmod{n}$ n'est autre que $a = b$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarque 2.32

Si $n = 0$, la relation $a \equiv b \pmod{n}$ n'est autre que $a = b$. Si $n = 1$, la relation $a \equiv b \pmod{n}$ est vraie pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarque 2.32

Si $n = 0$, la relation $a \equiv b \pmod{n}$ n'est autre que $a = b$. Si $n = 1$, la relation $a \equiv b \pmod{n}$ est vraie pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

Dans la suite de cette section, on suppose que $n \geq 2$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Théorème 2.33

Soit $n \geq 2$ un entier. La relation $a \equiv b \pmod{n}$ définie sur $\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. En effet, soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. En effet, soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : x = qn + r$ avec $0 \leq r < n$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. En effet, soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : x = qn + r$ avec $0 \leq r \leq n-1$ d'où il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : x \equiv a \pmod{n}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. En effet, soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : x = qn + r$ avec $0 \leq r < n$ d'où il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : x \equiv a \pmod{n}$ ainsi il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a \in \bar{x}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. En effet, soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : x = qn + r$ avec $0 \leq r < n$ d'où il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : x \equiv a \pmod{n}$ ainsi il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a \in \bar{x}$. Supposons maintenant qu'il existe $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a, a' \in \bar{x}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Congruences

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. En effet, soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : x = qn + r$ avec $0 \leq r < n$ d'où il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : x \equiv a \pmod{n}$ ainsi il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a \in \bar{x}$. Supposons maintenant qu'il existe $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a, a' \in \bar{x}$. Alors, $x \equiv a \pmod{n}$ et $x \equiv a' \pmod{n}$

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. En effet, soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : x = qn + r$ avec $0 \leq r \leq n-1$ d'où il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : x \equiv a \pmod{n}$ ainsi il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a \in \bar{x}$. Supposons maintenant qu'il existe $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a, a' \in \bar{x}$. Alors, $x \equiv a \pmod{n}$ et $x \equiv a' \pmod{n}$ d'où $x = qn + a$ et $x = q'n + a'$, avec $q, q' \in \mathbb{Z}$

Remarques 2.34

- 1 L'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Dans chaque classe de congruence modulo n , il existe un, et un seul, entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$, i.e., si $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists! a \in \bar{x}$ tel que $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. En effet, soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2 : x = qn + r$ avec $0 \leq r \leq n-1$ d'où il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : x \equiv a \pmod{n}$ ainsi il existe $a = r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a \in \bar{x}$. Supposons maintenant qu'il existe $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a, a' \in \bar{x}$. Alors, $x \equiv a \pmod{n}$ et $x \equiv a' \pmod{n}$ d'où $x = qn + a$ et $x = q'n + a'$, avec $q, q' \in \mathbb{Z}$ et donc, par unicité du reste dans la division euclidienne, $a = a'$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- ❶ Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- ① Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec l'addition dans $\mathbb{Z}$**).

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- 1) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec l'addition dans $\mathbb{Z}$**).
- 2) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- 1) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec l'addition dans $\mathbb{Z}$**).
- 2) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec la multiplication dans $\mathbb{Z}$**).

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- 1) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec l'addition dans $\mathbb{Z}$**).
- 2) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec la multiplication dans $\mathbb{Z}$**).

Démonstration.

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- 1) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec l'addition dans $\mathbb{Z}$**).
- 2) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec la multiplication dans $\mathbb{Z}$**).

Démonstration.

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- 1) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec l'addition dans $\mathbb{Z}$**).
- 2) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec la multiplication dans $\mathbb{Z}$**).

Démonstration.

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. Alors, $n \mid a_1 - b_1$ et $n \mid a_2 - b_2$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- 1) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec l'addition dans $\mathbb{Z}$**).
- 2) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec la multiplication dans $\mathbb{Z}$**).

Démonstration.

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. Alors, $n \mid a_1 - b_1$ et $n \mid a_2 - b_2$ d'où $n \mid (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.35

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- 1) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec l'addition dans $\mathbb{Z}$**).
- 2) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, alors $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$ (**Compatibilité de la congruence mod n avec la multiplication dans $\mathbb{Z}$**).

Démonstration.

Soit $n \geq 2$ un entier, a_1, a_2, b_1 et b_2 des entiers relatifs.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. Alors, $n \mid a_1 - b_1$ et $n \mid a_2 - b_2$ d'où $n \mid (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)$ et donc $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Démonstration.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Démonstration.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. On a
 $a_1 a_2 - b_1 b_2 =$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Démonstration.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. On a
$$a_1 a_2 - b_1 b_2 = a_1 a_2 - b_1 a_2 + b_1 a_2 - b_1 b_2 =$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Démonstration.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. On a
$$a_1 a_2 - b_1 b_2 = a_1 a_2 - b_1 a_2 + b_1 a_2 - b_1 b_2 = (a_1 - b_1)a_2 + (a_2 - b_2)b_1$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Démonstration.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. On a
$$a_1 a_2 - b_1 b_2 = a_1 a_2 - b_1 a_2 + b_1 a_2 - b_1 b_2 = (a_1 - b_1)a_2 + (a_2 - b_2)b_1$$
d'où $n \mid a_1 a_2 - b_1 b_2$ car $n \mid a_1 - b_1$ et $n \mid a_2 - b_2$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Démonstration.

- Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ et $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. On a
$$a_1 a_2 - b_1 b_2 = a_1 a_2 - b_1 a_2 + b_1 a_2 - b_1 b_2 = (a_1 - b_1) a_2 + (a_2 - b_2) b_1$$
d'où $n \mid a_1 a_2 - b_1 b_2$ car $n \mid a_1 - b_1$ et $n \mid a_2 - b_2$. Donc $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Proposition 2.36

Les correspondances suivantes $+$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $(\bar{x}, \bar{y}) \mapsto \overline{x+y}$ et $\cdot$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $(\bar{x}, \bar{y}) \mapsto \overline{x \cdot y}$ sont des applications et ainsi $+$ et $\cdot$ sont des lois de composition internes définies dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration.

- Soit $(\bar{x}_1, \bar{y}_1), (\bar{x}_2, \bar{y}_2) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ tels que $(\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (\bar{x}_2, \bar{y}_2)$. Alors,
$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{x}_2 \\ \bar{y}_1 = \bar{y}_2 \end{cases} \text{ d'où } \begin{cases} x_1 \equiv x_2 \pmod{n} \\ y_1 \equiv y_2 \pmod{n} \end{cases} \text{ ainsi } x_1 + y_1 \equiv x_2 + y_2 \pmod{n} \text{ et donc } \overline{x_1 + y_1} = \overline{x_2 + y_2}.$$
- Soit $(\bar{x}_1, \bar{y}_1), (\bar{x}_2, \bar{y}_2) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ tels que $(\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (\bar{x}_2, \bar{y}_2)$. Alors,
$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{x}_2 \\ \bar{y}_1 = \bar{y}_2 \end{cases} \text{ d'où } \begin{cases} x_1 \equiv x_2 \pmod{n} \\ y_1 \equiv y_2 \pmod{n} \end{cases} \text{ ainsi } x_1 \cdot y_1 \equiv x_2 \cdot y_2 \pmod{n} \text{ et donc } \overline{x_1 \cdot y_1} = \overline{x_2 \cdot y_2}.$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.37

L'addition et la multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ munissent cet ensemble d'une structure d'anneau commutatif non trivial. Cet anneau admet $\bar{0}$ pour élément nul et $\bar{1}$ pour unité.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $a \in \bar{x}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $a \in \bar{x}$ d'où il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : \bar{a} = \bar{x}$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $a \in \bar{x}$ d'où il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : \bar{a} = \bar{x}$, i.e., il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : f(a) = \bar{x}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $a \equiv x \pmod{n}$ d'où il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : \bar{a} = \bar{x}$, i.e., il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : f(a) = \bar{x}$. On a aussi f est injective :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $a \in \bar{x}$ d'où il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : \bar{a} = \bar{x}$, i.e., il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : f(a) = \bar{x}$. On a aussi f est injective : en effet, Soit $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tels que $f(a) = f(a')$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $a \in \bar{x}$ d'où il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : \bar{a} = \bar{x}$, i.e., il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : f(a) = \bar{x}$. On a aussi f est injective : en effet, Soit $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tels que $f(a) = f(a')$. Alors, $\bar{a} = \bar{a}'$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $a \in \bar{x}$ d'où il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : \bar{a} = \bar{x}$, i.e., il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : f(a) = \bar{x}$. On a aussi f est injective : en effet, Soit $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tels que $f(a) = f(a')$. Alors, $\bar{a} = \bar{a'}$ d'où $a' \in \bar{a}$ et ainsi il existe $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a, a' \in \bar{a}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.38

La correspondance $f : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est une bijection et ainsi $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ sont deux à deux distincts et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Démonstration.

Il est évident que f est une application bien définie. Montrons que f est surjective : Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors, il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $a \in \bar{x}$ d'où il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : \bar{a} = \bar{x}$, i.e., il existe $a \in \{0, 1, \dots, n-1\} : f(a) = \bar{x}$. On a aussi f est injective : en effet, Soit $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tels que $f(a) = f(a')$. Alors, $\bar{a} = \bar{a}'$ d'où $a' \in \bar{a}$ et ainsi il existe $a, a' \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a, a' \in \bar{a}$ donc $a = a'$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$. Comme $d \mid d$ et $d \mid n$, $d \mid 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$. Comme $d \mid d$ et $d \mid n$, $d \mid 1$ et donc $d = 1$.

Réciproquement, supposons que n est premier.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$. Comme $d \mid d$ et $d \mid n$, $d \mid 1$ et donc $d = 1$.

Réciproquement, supposons que n est premier. Soit $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$. Comme $d \mid d$ et $d \mid n$, $d \mid 1$ et donc $d = 1$.

Réciproquement, supposons que n est premier. Soit $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Puisque $n \nmid d$ et n est premier, $n \wedge d = 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$. Comme $d \mid d$ et $d \mid n$, $d \mid 1$ et donc $d = 1$.

Réciproquement, supposons que n est premier. Soit $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Puisque $n \nmid d$ et n est premier, $n \wedge d = 1$ d'où il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : un + vd = 1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$. Comme $d \mid d$ et $d \mid n$, $d \mid 1$ et donc $d = 1$.

Réciproquement, supposons que n est premier. Soit $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Puisque $n \nmid d$ et n est premier, $n \wedge d = 1$ d'où il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : un + vd = 1$ ainsi $\bar{v}\bar{d} = \bar{1}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$. Comme $d \mid d$ et $d \mid n$, $d \mid 1$ et donc $d = 1$.

Réciproquement, supposons que n est premier. Soit $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Puisque $n \nmid d$ et n est premier, $n \wedge d = 1$ d'où il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : un + vd = 1$ ainsi $\bar{v}\bar{d} = \bar{1}$ et par suite $\bar{d}$ est inversible

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 2.39

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Démonstration.

Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit d un diviseur positif de n différent de n . Alors, $\bar{d}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps et $\bar{d} \neq \bar{0}$ d'où il existe $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{d}\bar{k} = \bar{1}$ ainsi $1 - dk = hn$, avec $h \in \mathbb{Z}$, et par suite $1 = hn + dk$. Comme $d \mid d$ et $d \mid n$, $d \mid 1$ et donc $d = 1$.

Réciproquement, supposons que n est premier. Soit $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Puisque $n \nmid d$ et n est premier, $n \wedge d = 1$ d'où il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : un + vd = 1$ ainsi $\bar{v}\bar{d} = \bar{1}$ et par suite $\bar{d}$ est inversible donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. $\square$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Théorème 2.40 (Petit théorème de Fermat)

Soit $a \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Théorème 2.40 (Petit théorème de Fermat)

Soit $a \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier. Si p ne divise pas a , alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h - k)a$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h - k)a$ d'où $p \mid h - k$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \bar{x} \in X, \bar{x} \neq \bar{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \bar{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \bar{x} \in X, \bar{x} \neq \bar{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \bar{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$. Puisque $X = \{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et $\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$. Puisque $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts, $X = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$. Puisque $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts, $X = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Donc $\overline{a} \cdot \overline{2a} \dots \overline{(p-1)a} = \overline{1 \cdot 2 \dots (p-1)}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$. Puisque $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts, $X = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Donc $\overline{a} \cdot \overline{2a} \dots \overline{(p-1)a} = \overline{1 \cdot 2 \dots (p-1)}$ ainsi $(p-1)! a^{p-1} = (p-1)!$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$. Puisque $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts, $X = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Donc $\overline{a}.\overline{2a} \dots \overline{(p-1)a} = \overline{1.2 \dots (p-1)}$ ainsi $\overline{(p-1)!a^{p-1}} = \overline{(p-1)!}$, i.e., $((p-1)!)a^{p-1} \equiv ((p-1)!) \pmod{p}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$. Puisque $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts, $X = \overline{1 \cdot 2 \dots (p-1)a}$. Donc $\overline{a \cdot 2a \dots (p-1)a} = \overline{1 \cdot 2 \dots (p-1)}$ ainsi $\overline{(p-1)! a^{p-1}} = \overline{(p-1)!}$, i.e., $((p-1)!) a^{p-1} \equiv ((p-1)!) \pmod{p}$ d'où $p \mid (p-1)!(a^{p-1} - 1)$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \overline{x} \in X, \overline{x} \neq \overline{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \overline{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$. Puisque $X = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts, $X = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Donc $\overline{a} \cdot \overline{2a} \dots \overline{(p-1)a} = \overline{1 \cdot 2 \dots (p-1)}$ ainsi $\overline{(p-1)! a^{p-1}} = \overline{(p-1)!}$, i.e., $((p-1)!) a^{p-1} \equiv ((p-1)!) \pmod{p}$ d'où $p \mid (p-1)!(a^{p-1} - 1)$. Comme p ne divise pas $(p-1)!$, $p \mid (a^{p-1} - 1)$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a . On considère l'ensemble $X = \{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$. On a $\forall \bar{x} \in X, \bar{x} \neq \bar{0}$, sinon il existe $k \in \{1, \dots, (p-1)\} : \overline{ka} = \bar{0}$ d'où $p \mid ka$ donc $p \mid k$ ce qui est faux car $1 \leq k < p$. Alors, $X \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Aussi, les éléments $\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts : en effet, supposons que $\overline{ha} = \overline{ka}$, où $h, k \in \{1, \dots, (p-1)\}$. Alors, $p \mid ha - ka = (h-k)a$ d'où $p \mid h-k$ ainsi $p \mid |h-k|$. Puisque $1 \leq h, k < p$, $|h-k| < p$. Comme $p \mid |h-k|$ et $|h-k| < p$, $|h-k| = 0$ donc $h = k$. Puisque $X = \{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et $\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ sont deux à deux distincts, $X = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Donc $\overline{a \cdot 2a \cdots (p-1)a} = \overline{1 \cdot 2 \cdots (p-1)}$ ainsi $\overline{(p-1)! a^{p-1}} = \overline{(p-1)!}$, i.e., $((p-1)!) a^{p-1} \equiv ((p-1)!) \pmod{p}$ d'où $p \mid (p-1)!(a^{p-1} - 1)$. Comme p ne divise pas $(p-1)!$, $p \mid (a^{p-1} - 1)$, i.e., $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Petit théorème de Fermat

Corollaire 2.41

Si p est un nombre premier, alors pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Démonstration.

Soit $a \in \mathbb{Z}$.

Si $p \mid a$, alors $a \equiv 0 \pmod{p}$ et ainsi $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Si $p \nmid a$, alors, d'après le théorème précédent, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ d'où $a^p \equiv a \pmod{p}$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Définition 2.42

Pour tout entier $n \geq 1$, on note $\varphi(n)$ le nombre des entiers $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tels que $k \wedge n = 1$, i.e., $\varphi(n) = \text{card}\{k \in \{0, 1, \dots, n-1\} / k \wedge n = 1\}$.

L'application φ est appelée la **fonction indicatrice d'Euler** ou l'**indicateur d'Euler** et $\varphi(n)$ est dit indicateur d'Euler de n .

Remarque 2.43

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\varphi(n) = \text{card}\{k \in \{1, \dots, n\} / k \wedge n = 1\}$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Exemple 2.44

On a $\varphi(1) = 1, \varphi(2) = 1, \varphi(10) = 4$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Théorème 2.45

Si p est un nombre premier et $k > 0$ est un entier, alors $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Démonstration.

On a $\varphi(p^k) = \text{card}\{m \in \{1, 2, \dots, p^k\} / m \wedge p^k = 1\}$. Au lieu de compter les entiers $m \in \{1, 2, \dots, p^k\}$ tels que $m \wedge p^k = 1$, nous allons compter les entiers $m \in \{1, 2, \dots, p^k\}$ tels que $m \wedge p^k \neq 1$. Soit $m \in \{1, 2, \dots, p^k\}$. On a $m \wedge p^k \neq 1$ si, et seulement si, $p \mid m$, i.e., si, et seulement si, m est un multiple de p . Ainsi, $m \wedge p^k \neq 1$ si, et seulement si, $m \in \{1.p, 2.p, \dots, p^{k-1}.p\}$ d'où le nombre des entiers $m \in \{1, 2, \dots, p^k\}$ tels que $m \wedge p^k \neq 1$ est p^{k-1} et donc $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Lemme 2.46

Soit $a, b, c \in \mathbb{N}$. $a \wedge bc = 1$ si, et seulement si, $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$.

Démonstration.

Supposons que $a \wedge bc = 1$. Posons $d = a \wedge b$. Alors, $d \mid b$ d'où $d \mid bc$. Puisque $d \mid a$ et $d \mid bc$, $d \mid (a \wedge bc)$ ainsi $d \mid 1$ donc $d = 1$. De la même façon, on montre que $a \wedge c = 1$.

Réciproquement, supposons que $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$. Alors, il existe $u, v \in \mathbb{Z} : ua + vb = 1$ et il existe $s, t \in \mathbb{Z} : sa + tc = 1$ d'où $usa^2 + utac + vsab + vtbc = 1$, i.e., $(usa + utc + vsb)a + (vt)bc = 1$ et donc, d'après le lemme de Bézout, $a \wedge bc = 1$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Théorème 2.47

Soit $m, n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$. Si m et n sont premiers entre eux, alors
$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On écrit les entiers de 1 à mn sous la forme du tableau suivant avec n lignes et m colonnes :

1	2	...	r	...	m
$m+1$	$m+2$		$m+r$		$2m$
$2m+1$	$2m+2$		$2m+r$		$3m$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$(n-1)m+1$	$(n-1)m+2$		$(n-1)m+r$		nm

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On écrit les entiers de 1 à mn sous la forme du tableau suivant avec n lignes et m colonnes :

1	2	...	r	...	m
$m+1$	$m+2$		$m+r$		$2m$
$2m+1$	$2m+2$		$2m+r$		$3m$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$(n-1)m+1$	$(n-1)m+2$		$(n-1)m+r$		nm

On sait que $\varphi(mn)$ est le nombre des entiers $k \in \{1, \dots, mn\}$ tels que $k \wedge mn = 1$, i.e., $\varphi(mn)$ est le nombre des éléments de ce tableau qui sont premiers avec mn

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On écrit les entiers de 1 à mn sous la forme du tableau suivant avec n lignes et m colonnes :

1	2	...	r	...	m
$m+1$	$m+2$		$m+r$		$2m$
$2m+1$	$2m+2$		$2m+r$		$3m$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$(n-1)m+1$	$(n-1)m+2$		$(n-1)m+r$		nm

On sait que $\varphi(mn)$ est le nombre des entiers $k \in \{1, \dots, mn\}$ tels que $k \wedge mn = 1$, i.e., $\varphi(mn)$ est le nombre des éléments de ce tableau qui sont premiers avec mn et donc, d'après le lemme précédent, $\varphi(mn)$ est le nombre des éléments de ce tableau qui sont premiers à la fois avec m et avec n .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Montrons que dans chaque colonne de ces $\varphi(m)$ colonnes, il y a exactement $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Montrons que dans chaque colonne de ces $\varphi(m)$ colonnes, il y a exactement $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n : Supposons que $r \wedge m = 1$. dans la r ième colonne, on a exactement n entiers qui sont $r, m + r, 2m + r, \dots, (n - 1)m + r$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Montrons que dans chaque colonne de ces $\varphi(m)$ colonnes, il y a exactement $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n : Supposons que $r \wedge m = 1$. dans la r ième colonne, on a exactement n entiers qui sont $r, m + r, 2m + r, \dots, (n - 1)m + r$.

Aussi, ces entiers sont deux à deux non congrus modulo n , en effet :

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Montrons que dans chaque colonne de ces $\varphi(m)$ colonnes, il y a exactement $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n : Supposons que $r \wedge m = 1$. dans la r ième colonne, on a exactement n entiers qui sont $r, m + r, 2m + r, \dots, (n - 1)m + r$.

Aussi, ces entiers sont deux à deux non congrus modulo n , en effet : si $hm + r \equiv km + r \pmod{n}$, avec $0 \leq h, k \leq n - 1$,

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Montrons que dans chaque colonne de ces $\varphi(m)$ colonnes, il y a exactement $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n : Supposons que $r \wedge m = 1$. dans la r ième colonne, on a exactement n entiers qui sont $r, m + r, 2m + r, \dots, (n - 1)m + r$.

Aussi, ces entiers sont deux à deux non congrus modulo n , en effet : si $hm + r \equiv km + r \pmod{n}$, avec $0 \leq h, k \leq n - 1$, alors $hm \equiv km \pmod{n}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Montrons que dans chaque colonne de ces $\varphi(m)$ colonnes, il y a exactement $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n : Supposons que $r \wedge m = 1$. dans la r ième colonne, on a exactement n entiers qui sont

$r, m + r, 2m + r, \dots, (n - 1)m + r$.

Aussi, ces entiers sont deux à deux non congrus modulo n , en effet : si $hm + r \equiv km + r \pmod{n}$, avec $0 \leq h, k \leq n - 1$, alors $hm \equiv km \pmod{n}$ d'où $n \mid (h - k)m$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Montrons que dans chaque colonne de ces $\varphi(m)$ colonnes, il y a exactement $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n : Supposons que $r \wedge m = 1$. dans la r ième colonne, on a exactement n entiers qui sont $r, m + r, 2m + r, \dots, (n - 1)m + r$.

Aussi, ces entiers sont deux à deux non congrus modulo n , en effet : si $hm + r \equiv km + r \pmod{n}$, avec $0 \leq h, k \leq n - 1$, alors $hm \equiv km \pmod{n}$ d'où $n \mid (h - k)m$ ainsi $n \mid h - k$ car $n \wedge m = 1$ et par suite $n \mid h - k < n$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

On considère un élément de la r ième colonne. Cet élément est de la forme $qm + r$ et puisque $(qm + r) \wedge m = r \wedge m$, on a $qm + r$ et m sont premiers entre eux si, et seulement si, r et m sont premiers entre eux. Alors, on a exactement $\varphi(m)$ colonnes contenant des entiers premiers avec m et dans une telle colonne, chaque élément est premiers avec m .

Montrons que dans chaque colonne de ces $\varphi(m)$ colonnes, il y a exactement $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n : Supposons que $r \wedge m = 1$. dans la r ième colonne, on a exactement n entiers qui sont

$r, m + r, 2m + r, \dots, (n - 1)m + r$.

Aussi, ces entiers sont deux à deux non congrus modulo n , en effet : si $hm + r \equiv km + r \pmod{n}$, avec $0 \leq h, k \leq n - 1$, alors $hm \equiv km \pmod{n}$ d'où $n \mid (h - k)m$ ainsi $n \mid h - k$ car $n \wedge m = 1$ et par suite $n \mid |h - k| < n$ et donc $|h - k| = 0$, i.e., $h = k$.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

Puisque les n entiers $r, m+r, 2m+r, \dots, (n-1)m+r$ sont deux à deux non congrus modulo n , ces n entiers de la r ième colonne sont, dans un certain ordre, congrus modulo n à $0, 1, 2, \dots, n-1$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

Puisque les n entiers $r, m+r, 2m+r, \dots, (n-1)m+r$ sont deux à deux non congrus modulo n , ces n entiers de la r ième colonne sont, dans un certain ordre, congrus modulo n à $0, 1, 2, \dots, n-1$ et donc la r ième colonne et $\{0, 1, \dots, n-1\}$ contient le même nombre d'entiers qui sont premiers avec n (car si $s \equiv t \pmod{n}$, alors $s \wedge n = 1$ si, et seulement si, $t \wedge n = 1$)

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

Puisque les n entiers $r, m+r, 2m+r, \dots, (n-1)m+r$ sont deux à deux non congrus modulo n , ces n entiers de la r ième colonne sont, dans un certain ordre, congrus modulo n à $0, 1, 2, \dots, n-1$ et donc la r ième colonne et $\{0, 1, \dots, n-1\}$ contient le même nombre d'entiers qui sont premiers avec n (car si $s \equiv t \pmod{n}$, alors $s \wedge n = 1$ si, et seulement si, $t \wedge n = 1$) et donc on a $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n dans la r ième colonne.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

Puisque les n entiers $r, m+r, 2m+r, \dots, (n-1)m+r$ sont deux à deux non congrus modulo n , ces n entiers de la r ième colonne sont, dans un certain ordre, congrus modulo n à $0, 1, 2, \dots, n-1$ et donc la r ième colonne et $\{0, 1, \dots, n-1\}$ contient le même nombre d'entiers qui sont premiers avec n (car si $s \equiv t \pmod{n}$, alors $s \wedge n = 1$ si, et seulement si, $t \wedge n = 1$) et donc on a $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n dans la r ième colonne.

Alors, le nombre total des éléments de ce tableau qui sont premiers avec mn est $\varphi(m)\varphi(n)$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Démonstration.

Puisque les n entiers $r, m+r, 2m+r, \dots, (n-1)m+r$ sont deux à deux non congrus modulo n , ces n entiers de la r ième colonne sont, dans un certain ordre, congrus modulo n à $0, 1, 2, \dots, n-1$ et donc la r ième colonne et $\{0, 1, \dots, n-1\}$ contient le même nombre d'entiers qui sont premiers avec n (car si $s \equiv t \pmod{n}$, alors $s \wedge n = 1$ si, et seulement si, $t \wedge n = 1$) et donc on a $\varphi(n)$ éléments qui sont premiers avec n dans la r ième colonne.

Alors, le nombre total des éléments de ce tableau qui sont premiers avec mn est $\varphi(m)\varphi(n)$ et donc $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. □

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Théorème 2.48

Soit $n > 1$ un entier et $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$, avec $p_1, \dots, p_r$ des nombres premiers deux à deux distincts et $k_1, \dots, k_r$ des entiers > 0 , alors

$$\varphi(n) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \dots (p_r^{k_r} - p_r^{k_r-1}) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

Démonstration.

Utilisons une récurrence sur r :

On a déjà vu que si $r = 1$, le résultat est vrai.

Supposons que le résultat est vrai à un rang $r \geq 1$.

Soit $p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} p_{r+1}^{k_{r+1}}$, avec $p_1, \dots, p_{r+1}$ des nombres premiers deux à deux distincts et $k_1, \dots, k_{r+1}$ des entiers > 0 . Puisque $(p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}) \wedge p_{r+1}^{k_{r+1}} = 1$,

$$\varphi(p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} p_{r+1}^{k_{r+1}}) = \varphi((p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}) \cdot p_{r+1}^{k_{r+1}}) = \varphi(p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}) \varphi(p_{r+1}^{k_{r+1}}) \text{ ainsi}$$

$$\varphi(p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} p_{r+1}^{k_{r+1}}) = \varphi(p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}) \cdot (p_{r+1}^{k_{r+1}} - p_{r+1}^{k_{r+1}-1}) \text{ et donc, d'après l'hypothèse de récurrence,}$$

$$\varphi(p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} p_{r+1}^{k_{r+1}}) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \dots (p_r^{k_r} - p_r^{k_r-1}) (p_{r+1}^{k_{r+1}} - p_{r+1}^{k_{r+1}-1}). \text{ Alors, le}$$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Fonction indicatrice d'Euler

Exemple 2.49

On a $1800 = 2^3 3^2 5^2$. Alors,

$$\varphi(1800) = 2^2(2-1) \cdot 3(3-1) \cdot 5(5-1) = 480.$$