CORRIGE

Nom, Prénom : **Code :**

Documents permis : Tables IR et RMN¹H / Toute communication est interdite.

Barème : I : 3 pts ; II : 3 pts ; III : 3 pts ; IV : 3 pts ; V : 8 pts

I- Questions de cours

1- Donner l'expression de la fréquence de Larmor en fonction du champ magnétique H₀.

Cette fréquence est donnée par la relation :

$$\nu_0 = \gamma \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot H_0$$

γ : rapport gyromagnétique dépendant du noyau

H₀: champ magnétique statique

2- Parmi les molécules suivantes, quelle est celle pour laquelle on devrait observer un réarrangement de Mc Lafferty ? Donner le mécanisme de fragmentation correspondant.

Le réarrangement de Mc Lafferty peut avoir lieu lorsqu'on a un H en γ d'une insaturation. C'est le cas de la molécule B.

Mécanisme de fragmentation :

II- Une solution de (CH₃)₂C=CHCOCH₃ dans l'éthanol de concentration molaire C est placée dans une cuve de largeur 10 mm. Son spectre UV-visible est présenté ci-dessous.

1- Une première bande est observée à $\lambda_1 = 232$ nm avec une absorbance $A_1 = 2,2$ ($\epsilon_1 = 12600$ L.mol⁻¹.cm⁻¹). Calculer la concentration molaire C de la solution.

Loi de Beer-Lambert : $A = \epsilon l C \Leftrightarrow$

$$C = A / \epsilon l$$

A.N. : $C = 2,2 / 12600 \times 1 = 1,75 \cdot 10^{-4}$

A : sans unité

ϵ : L.mol⁻¹.cm⁻¹

l : cm

La concentration molaire est égale à : $C = 1,75 \cdot 10^{-4}$ mol.L⁻¹

2- Une deuxième bande est observée à $\lambda_2 = 330$ nm ($\epsilon_2 = 78$ L.mol⁻¹.cm⁻¹). Attribuer les bandes I et II aux transitions correspondantes. Justifier votre réponse.

Bande I : transition $\pi \rightarrow \pi^*$ car $\epsilon_1 > 1000$

Bande II : transition $n \rightarrow \pi^*$ car $\epsilon_2 < 100$

3- Indiquer sans justifier l'effet qu'on aurait sur la longueur d'onde de chacune de ces bandes si on utilisait le cyclohexane comme solvant au lieu de l'éthanol ?

En passant d'un solvant polaire (Ethanol) à un solvant non polaire (cyclohexane) :

- la bande I correspondant à une transition $\pi \rightarrow \pi^*$ subit un effet hypsochrome (λ diminue),

- la bande II correspondant à une transition $n \rightarrow \pi^*$ subit un effet bathochrome (λ augmente).

III- La liaison $C \equiv N$ vibre vers 2100 cm⁻¹. On donne : les masses molaires $M_C = 12$, $M_N = 14$; le nombre d'Avogadro $\mathcal{N} = 6,02 \cdot 10^{23}$; la célérité $c = 3 \cdot 10^8$ m.s⁻¹

1- Dans quel domaine du spectre électromagnétique cette transition se situe-t-elle ?

Elle se situe dans le domaine de l'infrarouge (IR moyen : $4000-400$ cm⁻¹).

2- Déterminer la valeur de la constante de force k en dyn.cm⁻¹.

Le nombre d'onde de vibration est donnée par la relation (loi de Hooke) :

$$\bar{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad \mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$$

Dans le système C.G.S. :

$\bar{\nu}$: nombre d'onde en cm^{-1}

c : célérité en $\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$

k : constante de force de la liaison en $\text{dyn}\cdot\text{cm}^{-1}$

μ : masse réduite en gramme

m_A et m_B : masses en gramme des atomes A et B respectivement (Ici, A=C et B=N)

D'où la constante de force $k = 4\pi^2 c^2 \bar{\nu}^2 \mu$

$$\mu_{\text{C}\equiv\text{N}} = \frac{1}{N} \frac{M_{\text{C}} M_{\text{N}}}{M_{\text{C}} + M_{\text{N}}} \quad \text{avec } N : \text{nombre d'Avogadro et } M : \text{masse molaire}$$

$$\text{A.N. : } \mu_{\text{C}\equiv\text{N}} = \frac{1}{6,02 \cdot 10^{23}} \frac{12 \times 14}{12 + 14} = 1,07 \cdot 10^{-23} \text{ g}$$

$$k = 4 \times (3,14)^2 \times (3 \cdot 10^{10})^2 \times (2100)^2 \times 1,07 \cdot 10^{-23}$$

$$k = 1,675 \cdot 10^6 \text{ dyn}\cdot\text{cm}^{-1}$$

IV- Un composé contenant carbone, hydrogène et chlore donne le spectre de masse ci-dessous.

1- Etudier l'aspect général du spectre.

Pic parent : $m/z = 84$ (correspond au pic de masse = masse moléculaire calculée avec les masses des isotopes les plus abondants : carbone 12, hydrogène 1 et chlore 35)

Pic de base : $m/z = 49$ (correspond au pic d'intensité relative 100)

2- D'après l'amas isotopique 84/86/88, combien d'atomes de chlore ce composé contient-il ? Justifier.

D'une manière générale, le nombre et les intensités relatives des pics constituant l'amas isotopique sont déterminés à partir de la relation : $(a+b)^n$

a : abondance relative de l'isotope le plus léger

b : abondance relative de l'isotope le plus lourd prise égale à l'unité

n : nombre d'atomes de l'élément considéré

Comme on a trois pics dans l'amas isotopique de l'ion moléculaire, alors $n = 2$.

En effet : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (Cl : a = 3 (chlore 35), b = 1(chlore 37))
 d'intensités 9 6 1
 et de masses M M+2 M+4
 84 86 88

On a donc 2 atomes de chlore dans le composé étudié.

3- Déterminer la structure du composé étudié. Justifier.

Comme ce composé contient deux chlores, il est de type RCl_2 .

Masse RCl_2 : $M = 84 = M_R + 2 M_{Cl}$ $\Rightarrow$

$M_{Cl} = 35 \Rightarrow M_R = 14$ donc $R = CH_2$

Le composé est donc CH_2Cl_2 .

4- Expliquer les pics à $m/z = 49$ et 51.

$84 - 49 = 35$ montre qu'il y a perte d'un chlore à partir de l'ion moléculaire :

Dans ce cation CH_2Cl^+ , il y a un seul chlore (ayant des isotopes ^{35}Cl et ^{37}Cl). L'amas isotopique pour un chlore est composé de deux pics d'intensités relatives 3/1 et de masses respectives M et M+2 ($(a+b)^1$).

Les deux pics à 49 et 51 ont un rapport d'intensité 3/1 et ont des masses avec un écart = 2.

Donc **$m/z = 49$: CH_2Cl^+ pour l'isotope chlore 35**

$m/z = 51$: CH_2Cl^+ pour l'isotope chlore 37.

V- Un composé de formule brute $C_9H_{12}O$ donne les spectres ci-dessous. A partir de l'analyse de ces données spectrales, déterminer la structure de ce composé.

Degré d'insaturation $I = 4$, probablement noyau benzénique.

Analyse du spectre IR

Nb. d'onde, cm ⁻¹	Attribution
3345	νOH (alcool)
3062	} ν=CH (type benzénique car I=4)
3026	
2952	ν ^a CH ₃
2930	ν ^a CH ₂
2875	ν ^s CH ₃
1603	} νC=C (Benzénique)
1495	
1453	
1383	δ ^s CH ₃
1040	νC-O (Alcool primaire)
760	γ=CH (Benzène monosubstitué : 5H adjacents)
700	γ=CH (Benzène monosubstitué : 5H adjacents)

Analyse du spectre RMN

Signal	δ ppm	Nb. de H	Attribution
Doublet	1,25	3	CH ₃ adjacent à CH
Sextuplet	2,9	1	CH adjacent à 5H (donc CH ₃ -CH-CH ₂)
Doublet	3,6	2	CH ₂ adjacent à CH (déblindé, donc adjacent aussi à l'oxygène)
Singulet (large)	4,65	1	OH (signal large et disparaît par addition de D ₂ O : H labile)
Singulet	7,2	5	5H aromatiques : noyau benzénique monosubstitué

Structure

IR : alcool primaire **CH₂-OH**, CH₂ et CH₃, benzène monosubstitué

RMN : confirme CH₂ et CH₃, OH et benzène monosubstitué. De plus, l'analyse montre la présence de CH₃-CH-CH₂.

Donc, **la structure compatible avec ces résultats est :**