

Université Mohammed V.  
Faculté des sciences  
Dep. de Mathématiques -Rabat.

Année 2014-2015.

**Analyse (SMPC)**

**A. Hanine et E. Zerouali**

# Chapitre 1

## Les suites

### 1. Définitions

#### 1.1. Définition d'une suite

##### Définition 1

- Une **suite** est une application  $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ .
- Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $u(n)$  par  $u_n$  et on l'appelle  $n$ -ème **terme** ou **terme général** de la suite.

La suite est notée  $u$ , ou plus souvent  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ou simplement  $(u_n)$ . Il arrive fréquemment que l'on considère des suites définies à partir d'un certain entier naturel  $n_0$  plus grand que 0, on note alors  $(u_n)_{n \geq n_0}$ .

##### Exemple 1

- $(\sqrt{n})_{n \geq 0}$  est la suite de termes :  $0, 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots$
- $((-1)^n)_{n \geq 0}$  est la suite qui alterne  $+1, -1, +1, -1, \dots$
- $(\frac{1}{n^2})_{n \geq 1}$ . Les premiers termes sont  $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots$


#### 1.2. Suite majorée, minorée, bornée

##### Définition 2

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite.

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **majorée** si  $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq M$ .
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **minorée** si  $\exists m \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq m$ .
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **bornée** si elle est majorée et minorée, ce qui revient à dire :

$$\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n| \leq M.$$



### 1.3. Suite croissante, décroissante

#### Définition 3

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite.


- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **croissante** si  $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geq u_n$ .
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **décroissante** si  $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \leq u_n$ .
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

#### Remarque

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante si et seulement si  $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n \geq 0$ .
- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite à termes strictement positifs, elle est croissante si et seulement si  $\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ .

#### Exemple 2

La suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  définie par  $u_n = (-1)^n/n$  pour  $n \geq 1$ , n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée par  $1/2$  (borne atteinte en  $n = 2$ ), minorée par  $-1$  (borne atteinte en  $n = 1$ ).



- La suite  $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$  est une suite décroissante. Elle est majorée par 1 (borne atteinte pour  $n = 1$ ), elle est minorée par 0 mais cette valeur n'est jamais atteinte.

## 2. Limites

### 2.1. Limite finie, limite infinie


Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite.

#### Définition 4

La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  a pour **limite**  $\ell \in \mathbb{R}$  si : pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe un entier naturel  $N$  tel que si  $n \geq N$  alors  $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$  :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon)$$

On dit aussi que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **tend vers**  $\ell$ . Autrement dit :  $u_n$  est proche d'aussi près que l'on veut de  $\ell$ , à partir d'un certain rang.

**Définition 5**

1. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **tend vers**  $+\infty$  si :

$$\forall A > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies u_n \geq A)$$

2. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **tend vers**  $-\infty$  si :

$$\forall A > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies u_n \leq -A)$$

**Remarque**

- On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  ou parfois  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ , et de même pour une limite  $\pm\infty$ .
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} -u_n = +\infty$ .
- On raccourcit souvent la phrase logique en :  $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon)$ . Noter que  $N$  dépend de  $\varepsilon$  et qu'on ne peut pas échanger l'ordre du « pour tout » et du « il existe ».
- L'inégalité  $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$  signifie  $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$ . On aurait aussi pu définir la limite par la phrase :  $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon)$ , où l'on a remplacé la dernière inégalité large par une inégalité stricte.

**Définition 6**

Une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **convergente** si elle admet une limite **finie**. Elle est **divergente** sinon (c'est-à-dire soit la suite tend vers  $\pm\infty$ , soit elle n'admet pas de limite).

On va pouvoir parler de **la** limite, si elle existe, car il y a unicité de la limite :

**Proposition 1**

Si une suite est convergente, sa limite est unique.

**Démonstration**

On procède par l'absurde. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite convergente ayant deux limites  $\ell \neq \ell'$ . Choisissons  $\varepsilon > 0$  tel que  $\varepsilon < \frac{|\ell - \ell'|}{2}$ .

Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ , il existe  $N_1$  tel que  $n \geq N_1$  implique  $|u_n - \ell| < \varepsilon$ .

De même  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell'$ , il existe  $N_2$  tel que  $n \geq N_2$  implique  $|u_n - \ell'| < \varepsilon$ .

Notons  $N = \max(N_1, N_2)$ , on a alors pour ce  $N$  :

$$|u_N - \ell| < \varepsilon \quad \text{et} \quad |u_N - \ell'| < \varepsilon$$

Donc  $|\ell - \ell'| = |\ell - u_N + u_N - \ell'| \leq |\ell - u_N| + |u_N - \ell'|$  d'après l'inégalité triangulaire. On en tire

$|\ell - \ell'| \leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon < |\ell - \ell'|$ . On vient d'aboutir à l'inégalité  $|\ell - \ell'| < |\ell - \ell'|$  qui est impossible. Bilan : notre hypothèse de départ est fautive et donc  $\ell = \ell'$ .

## 2.2. Propriétés des limites

### Proposition 2

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0$ ,
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = |\ell|$ .

### Démonstration

Cela résulte directement de la définition.

### Proposition 3 : Opérations sur les limites

Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites convergentes.

- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ , où  $\ell \in \mathbb{R}$ , alors pour  $\lambda \in \mathbb{R}$  on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \lambda \ell$ .
- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'$ , où  $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ , alors

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) &= \ell + \ell' \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) &= \ell \times \ell' \end{aligned}$$

- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  où  $\ell \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  alors  $u_n \neq 0$  pour  $n$  assez grand et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}$ .

Nous utilisons continuellement ces propriétés, le plus souvent sans nous en rendre compte.

### Exemple 3

Si  $u_n \rightarrow \ell$  avec  $\ell \neq \pm 1$ , alors

$$u_n(1 - 3u_n) - \frac{1}{u_n^2 - 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell(1 - 3\ell) - \frac{1}{\ell^2 - 1}.$$

### Proposition 4 : Opérations sur les limites infinies

Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites telles que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .


- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{v_n} = 0$
- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est minorée alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$
- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est minorée par un nombre  $\lambda > 0$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = +\infty$
- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$  et  $u_n > 0$  pour  $n$  assez grand alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = +\infty$ .

### Exemple 4

Si  $(u_n)$  est la suite de terme général  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = 0$ .

**Proposition 5**

Toute suite convergente est bornée.

**Démonstration**

Donc si on pose

$$M = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, |l| + 1)$$

on a alors  $\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n| \leq M$ .

**Proposition 6**

Si la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = 0$ .

**Exemple 5**

Si  $(u_n)_{n \geq 1}$  est la suite donnée par  $u_n = \cos(n)$  et  $(v_n)_{n \geq 1}$  est celle donnée par  $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n v_n) = 0$ .

**2.3. Formes indéterminées**

Dans certaines situations, on ne peut rien dire a priori sur la limite, il faut faire une étude au cas par cas.

**Exemple 6**

- «  $+\infty - \infty$  » Cela signifie que si  $u_n \rightarrow +\infty$  et  $v_n \rightarrow -\infty$  il faut faire l'étude en fonction de chaque suite pour  $\lim(u_n + v_n)$  comme le prouve les exemples suivants.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^n - \ln(n)) = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - n^2) = -\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \left( n + \frac{1}{n} \right) - n \right) = 0$$

**2.4. Limite et inégalités****Proposition 7**

1. Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites convergentes telles que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ . Alors


$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

2. Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites telles que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq u_n$ . Alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .

3. Théorème des « gendarmes » : si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont trois suites telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq v_n \leq w_n$$

et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$ , alors la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$ .



### Remarque

1. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite convergente telle que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$ . Alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq 0$ .
2. Attention : si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite convergente telle que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ , on ne peut affirmer que la limite est strictement positive mais seulement que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq 0$ . Par exemple la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  donnée par  $u_n = \frac{1}{n+1}$  est à termes strictement positifs, mais converge vers zéro.

### Exemple 7 : Exemple d'application du théorème des « gendarmes »

Trouver la limite de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de terme général :

$$u_n = 2 + \frac{(-1)^n}{1+n+n^2}$$

## 3. Exemples remarquables

### 3.1. Suite géométrique

#### Proposition 8 : Suite géométrique

On fixe un réel  $a$ . Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de terme général :  $u_n = a^n$ .

1. Si  $a = 1$ , on a pour tout  $n \in \mathbb{N} : u_n = 1$ .
2. Si  $a > 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .
3. Si  $-1 < a < 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .
4. Si  $a \leq -1$ , la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge.

#### Démonstration

1. est évident.

2. Écrivons  $a = 1 + b$  avec  $b > 0$ . Alors le binôme de Newton s'écrit  $a^n = (1 + b)^n = 1 + nb + \binom{n}{2}b^2 + \dots + \binom{n}{k}b^k + \dots + b^n$ . Tous les termes sont positifs, donc pour tout entier naturel  $n$  on a :  $a^n \geq 1 + nb$ . Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + nb) = +\infty$  car  $b > 0$ . On en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$ .
3. Si  $a = 0$ , le résultat est clair. Sinon, on pose  $b = |\frac{1}{a}|$ . Alors  $b > 1$  et d'après le point précédent  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b^n = +\infty$ . Comme pour tout entier naturel  $n$  on a :  $|a|^n = \frac{1}{b^n}$ , on en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$ , et donc aussi  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$ .
4. Supposons par l'absurde que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers le réel  $\ell$ . De  $a^2 \geq 1$ , on déduit que pour tout entier naturel  $n$ , on a  $a^{2n} \geq 1$ . En passant à la limite, il vient  $\ell \geq 1$ . Comme de plus pour tout entier naturel  $n$  on a  $a^{2n+1} \leq a \leq -1$ , il vient en passant de nouveau à la limite  $\ell \leq -1$ . Mais comme on a déjà  $\ell \geq 1$ , on obtient une contradiction, et donc  $(u_n)$  ne converge pas.

### 3.2. Série géométrique

#### Proposition 9 : Série géométrique

Soit  $a$  un réel,  $a \neq 1$ . En notant  $\sum_{k=0}^n a^k = 1 + a + a^2 + \dots + a^n$ , on a :

$$\sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

#### Démonstration

En multipliant par  $1 - a$  on fait apparaître une somme télescopique (presque tous les termes s'annulent) :

$$(1 - a)(1 + a + a^2 + \dots + a^n) = (1 + a + a^2 + \dots + a^n) - (a + a^2 + \dots + a^{n+1}) = 1 - a^{n+1}.$$

#### Remarque

Si  $a \in ]-1, 1[$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est la suite de terme général :  $u_n = \sum_{k=0}^n a^k$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{1 - a}$ . De manière plus frappante, on peut écrire :

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots = \frac{1}{1 - a}$$

Enfin, ces formules sont aussi valables si  $a \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ . Si  $a = 1$ , alors  $1 + a + a^2 + \dots + a^n = n + 1$ .

### 3.3. Suites telles que $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < \ell < 1$

#### Théorème 1

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de réels non nuls. On suppose qu'il existe un réel  $\ell$  tel que pour tout entier naturel  $n$  (ou seulement à partir d'un certain rang) on ait :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < \ell < 1.$$

Alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .

### 3.4. Approximation des réels par des décimaux

#### Proposition 10

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Posons

$$u_n = \frac{E(10^n a)}{10^n}.$$

Alors  $u_n$  est une approximation décimale de  $a$  à  $10^{-n}$  près, en particulier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ .

#### Exemple 8

$\pi = 3,14159265\dots$

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{E(10^0 \pi)}{10^0} = E(\pi) = 3 \\ u_1 &= \frac{E(10^1 \pi)}{10^1} = \frac{E(31,415\dots)}{10} = 3,1 \\ u_2 &= \frac{E(10^2 \pi)}{10^2} = \frac{E(314,15\dots)}{100} = 3,14 \\ u_3 &= 3,141 \end{aligned}$$

#### Démonstration

D'après la définition de la partie entière, on a

$$E(10^n a) \leq 10^n a < E(10^n a) + 1$$

donc

$$u_n \leq a < u_n + \frac{1}{10^n}$$

ou encore

$$0 \leq a - u_n < \frac{1}{10^n}.$$

Or la suite de terme général  $\frac{1}{10^n}$  est une suite géométrique de raison  $\frac{1}{10}$ , donc elle tend vers 0. On en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ .

#### Exercice 1

Montrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de la proposition 10 est croissante.

#### Remarque

1. Les  $u_n$  sont des nombres décimaux, en particulier ce sont des nombres rationnels.
2. Ceci fournit une démonstration de la densité de  $\mathbb{Q}$  dans  $\mathbb{R}$ . Pour  $\varepsilon > 0$ , et  $I = ]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ , alors pour  $n$  assez grand,  $u_n \in I \cap \mathbb{Q}$ .

## 4. Théorème de convergence

### 4.1. Toute suite convergente est bornée

On a

**Proposition 11**

Toute suite convergente est bornée.

La réciproque est fautive mais nous allons ajouter une hypothèse supplémentaire pour obtenir des résultats.

**4.2. Suite monotone****Théorème 2**

Toute suite croissante et majorée est convergente.

**Remarque**

Et aussi :

- Toute suite décroissante et minorée est convergente.
- Une suite croissante et qui n'est pas majorée tend vers  $+\infty$ .
- Une suite décroissante et qui n'est pas minorée tend vers  $-\infty$ .

**4.3. Deux exemples**

$\zeta(2)$

Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  la suite de terme général :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

- La suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est croissante : en effet  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$ .
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel  $n \geq 1$  on a  $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ .
  - Pour  $n = 1$ , on a  $u_1 = 1 \leq 2 - \frac{1}{1}$ .
  - Fixons  $n \geq 1$  pour lequel on suppose  $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ . Alors  $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}$ . Or  $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ , donc  $u_{n+1} \leq 2 - \frac{1}{n+1}$ , ce qui achève la récurrence.
- Donc la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est croissante et majorée par 2 : elle converge.

**Remarque**

On note  $\zeta(2)$  cette limite, vous montrerez plus tard qu'en fait  $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ .

**Suite harmonique**

C'est la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  de terme général :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Calculons  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

- La suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est croissante : en effet  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} > 0$ .
- Minoration de  $u_{2^p} - u_{2^{p-1}}$ . On a  $u_2 - u_1 = 1 + \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2}$  ;  $u_4 - u_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ , et en général :

$$u_{2^p} - u_{2^{p-1}} = \underbrace{\frac{1}{2^{p-1}+1} + \frac{1}{2^{p-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^p}}_{2^{p-1}-2^{p-1} \text{ termes } \geq \frac{1}{2^p}} > 2^{p-1} \times \frac{1}{2^p} = \frac{1}{2}$$

-  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ . En effet

$$u_{2^p} - 1 = u_{2^p} - u_1 = (u_2 - u_1) + (u_4 - u_2) + \dots + (u_{2^p} - u_{2^{p-1}}) \geq \frac{p}{2}$$

donc la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est croissante mais n'est pas bornée, donc elle tend vers  $+\infty$ .

#### 4.4. Suites adjacentes

##### Définition 7

Les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont dites **adjacentes** si

1.  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante,
2. pour tout  $n \geq 0$ , on a  $u_n \leq v_n$ ,
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ .

##### Théorème 3

Si les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de  $(u_n)$  et  $(v_n)$  et en plus l'égalité des limites. Les termes de la suites sont ordonnées ainsi :

$$u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq \dots \leq u_n \leq \dots \leq v_n \leq \dots \leq v_2 \leq v_1 \leq v_0$$

##### Démonstration

- La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante et majorée par  $v_0$ , donc elle converge vers une limite  $\ell$ .
- La suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante et minorée par  $u_0$ , donc elle converge vers une limite  $\ell'$ .
- Donc  $\ell' - \ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ , d'où  $\ell' = \ell$ .

##### Exemple 9

Reprenons l'exemple de  $\zeta(2)$ . Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  les deux suites définies pour  $n \geq 1$  par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{2}{n+1}.$$

Montrons que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont deux suites adjacentes :

1. (a)  $(u_n)$  est croissante car  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$ .  
 (b)  $(v_n)$  est décroissante :  $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{2}{n+2} - \frac{2}{n+1} = \frac{n+2+2(n+1)^2-2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
2. Pour tout  $n \geq 1$  :  $v_n - u_n = \frac{2}{n+1} > 0$ , donc  $u_n \leq v_n$ .
3. Enfin comme  $v_n - u_n = \frac{2}{n+1}$  donc  $\lim(v_n - u_n) = 0$ .

Les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont deux suites adjacentes, elles convergent donc vers une même limite finie  $\ell$ . Nous avons en plus l'encadrement  $u_n \leq \ell \leq v_n$  pour tout  $n \geq 1$ . Ceci fournit des approximations de la limite : par exemple pour  $n = 3$ ,  $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \leq \ell \leq 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{2}$  donc  $1,3611\dots \leq \ell \leq 1,8611\dots$

**Exercice 2**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite. On suppose que les deux sous-suites  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent vers la même limite  $\ell$ . Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge également vers  $\ell$ .

**5. Suites récurrentes**

Une catégorie essentielle de suites sont les suites récurrentes définies par une fonction. Ce chapitre est l'aboutissement de notre étude sur les suites, mais nécessite aussi l'étude de fonctions (voir «Limites et fonctions continues»).

**5.1. Suite récurrente définie par une fonction**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Une **suite récurrente** est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$u_0 \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour } n \geq 0$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial  $u_0$ , et une relation de récurrence  $u_{n+1} = f(u_n)$ . La suite s'écrit ainsi :

$$u_0, \quad u_1 = f(u_0), \quad u_2 = f(u_1) = f(f(u_0)), \quad u_3 = f(u_2) = f(f(f(u_0))), \dots$$

Le comportement peut très vite devenir complexe.

**Exemple 10**

Soit  $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ . Fixons  $u_0 = 2$  et définissons pour  $n \geq 0$  :  $u_{n+1} = f(u_n)$ . C'est-à-dire  $u_{n+1} = 1 + \sqrt{u_n}$ . Alors les premiers termes de la suite sont :

$$2, \quad 1 + \sqrt{2}, \quad 1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}, \quad 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}, \quad 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}}, \dots$$


Voici un résultat essentiel concernant la limite si elle existe.

**Proposition 12**

Si  $f$  est une fonction continue et la suite récurrente  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ , alors  $\ell$  est une solution de l'équation :

$$f(\ell) = \ell$$

Si on arrive à montrer que la limite existe alors cette proposition permet de calculer des candidats à être cette limite.



Une valeur  $\ell$ , vérifiant  $f(\ell) = \ell$  est un **point fixe** de  $f$ . La preuve est très simple et mérite d'être refaite à chaque fois.

### Démonstration

Lorsque  $n \rightarrow +\infty$ ,  $u_n \rightarrow \ell$  et donc aussi  $u_{n+1} \rightarrow \ell$ . Comme  $u_n \rightarrow \ell$  et que  $f$  est continue alors la suite  $(f(u_n)) \rightarrow f(\ell)$ . La relation  $u_{n+1} = f(u_n)$  devient à la limite (lorsque  $n \rightarrow +\infty$ ) :  $\ell = f(\ell)$ .

Nous allons étudier en détail deux cas particuliers fondamentaux : lorsque la fonction est croissante, puis lorsque la fonction est décroissante.

## 5.2. Cas d'une fonction croissante

Commençons par remarquer que pour une fonction croissante, le comportement de la suite  $(u_n)$  définie par récurrence est assez simple :


- Si  $u_1 \geq u_0$  alors  $(u_n)$  est croissante.
- Si  $u_1 \leq u_0$  alors  $(u_n)$  est décroissante.

La preuve est une simple récurrence : par exemple si  $u_1 \geq u_0$ , alors comme  $f$  est croissante on a  $u_2 = f(u_1) \geq f(u_0) = u_1$ . Partant de  $u_2 \geq u_1$  on en déduit  $u_3 \geq u_2, \dots$

Voici le résultat principal :

### Proposition 13

Si  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  une fonction continue et **croissante**, alors quelque soit  $u_0 \in [a, b]$ , la suite récurrente  $(u_n)$  est monotone et converge vers  $\ell \in [a, b]$  vérifiant  $f(\ell) = \ell$ .



Le graphe de  $f$  joue un rôle très important, il faut le tracer même si on ne le demande pas explicitement. Il permet de se faire une idée très précise du comportement de la suite : Est-elle croissante ? Est-elle positive ? Semble-t-elle converger ? Vers quelle limite ? Ces indications sont essentielles pour savoir ce qu'il faut montrer lors de l'étude de la suite.

## 5.3. Cas d'une fonction décroissante

### Proposition 14

Soit  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  une fonction continue et **décroissante**. Soit  $u_0 \in [a, b]$  et la suite récurrente  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Alors :

- La sous-suite  $(u_{2n})$  converge vers une limite  $\ell$  vérifiant  $f \circ f(\ell) = \ell$ .

– La sous-suite  $(u_{2n+1})$  converge vers une limite  $\ell'$  vérifiant  $f \circ f(\ell') = \ell'$ .

Il se peut (ou pas !) que  $\ell = \ell'$ .

## 6. Exercices

1. La suite  $\left(\frac{n}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$  est-elle monotone ? Est-elle bornée ?
2. La suite  $\left(\frac{n \sin(n!)}{1+n^2}\right)_{n \in \mathbb{N}}$  est-elle bornée ?
3. Donner la négation mathématique de chacune des phrases. (a) La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est majorée par 7. (b) La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est constante. (c) La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement positive à partir d'un certain rang. (d)  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'est pas strictement croissante.
4. Est-il vrai qu'une suite croissante est minorée ? Majorée
5. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$ . En utilisant la définition de la limite montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ . Trouver explicitement un rang à partir duquel  $1,999 \leq u_n \leq 2,001$ .
6. Déterminer la limite  $\ell$  de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de terme général :  $\frac{n+\cos n}{n-\sin n}$  et trouver un entier  $N$  tel que si  $n \geq N$ , on ait  $|u_n - \ell| \leq 10^{-2}$ .
7. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de terme général  $(-1)^n e^n$  admet-elle une limite ? Et la suite de terme général  $\frac{1}{u_n}$  ?
8. Déterminer la limite de la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  de terme général  $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ . Idem avec  $v_n = \frac{\cos n}{\sin n + \ln n}$ . Idem avec  $w_n = \frac{n!}{n^n}$ .
9. Déterminer la limite de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de terme général  $5^n - 4^n$ .
10. Soit  $v_n = 1 + a + a^2 + \dots + a^n$ . Pour quelle valeur de  $a \in \mathbb{R}$  la suite  $(v_n)_{n \geq 1}$  a pour limite 3 (lorsque  $n \rightarrow +\infty$ ) ?
11. Calculer la limite de  $\frac{1+2+2^2+\dots+2^n}{2^n}$ .
12. Montrer que la somme des racines  $n$ -ièmes de l'unité est nulle.
13. Montrer que si  $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$  alors  $\frac{1}{2} + \cos(\theta) + \cos(2\theta) + \dots + \cos(n\theta) = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})\theta)}{2 \sin(\frac{\theta}{2})}$  (penser à  $e^{i\theta}$ ).
14. Soit  $(u_n)_{n \geq 2}$  la suite de terme général  $u_n = \ln(1 + \frac{1}{2}) \times \ln(1 + \frac{1}{3}) \times \dots \times \ln(1 + \frac{1}{n})$ . Déterminer la limite de  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ . Que peut-on en déduire ?
15. Déterminer la limite de  $\frac{\pi^n}{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n+1)}$  (où  $\pi = 3,14\dots$ ).
16. Soit  $a$  un réel. Montrer que pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe un couple  $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  (et même une infinité) tel que  $|a - \frac{m}{2^n}| \leq \varepsilon$ .
17. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 1$  et pour  $n \geq 1$ ,  $u_n = \sqrt{2 + u_{n-1}}$ . Montrer que cette suite est croissante et majorée par 2. Que peut-on en conclure ?
18. Soit  $(u_n)_{n \geq 2}$  la suite définie par  $u_n = \frac{\ln 4}{\ln 5} \times \frac{\ln 6}{\ln 7} \times \frac{\ln 8}{\ln 9} \times \dots \times \frac{\ln(2n)}{\ln(2n+1)}$ . Étudier la croissance de la suite. Montrer que la suite  $(u_n)$  converge.
19. Soit  $N \geq 1$  un entier et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de terme général  $u_n = \cos(\frac{n\pi}{N})$ . Montrer que la suite diverge.
20. Montrer que les suites de terme général  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$  et  $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot (n!)}$  sont adjacentes. Que peut-on en déduire ?
21. Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  la suite de terme général  $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ . On considère les deux suites extraites de terme général  $v_n = u_{2n}$  et  $w_n = u_{2n+1}$ . Montrer que les deux suites  $(v_n)_{n \geq 1}$  et  $(w_n)_{n \geq 1}$  sont adjacentes. En déduire que la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  converge.
22. Montrer qu'une suite bornée et divergente admet deux sous-suites convergeant vers des valeurs distinctes.

23. Soit  $f(x) = \frac{1}{9}x^3 + 1$ ,  $u_0 = 0$  et pour  $n \geq 0$  :  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Étudier en détails la suite  $(u_n)$  : (a) montrer que  $u_n \geq 0$  ; (b) étudier et tracer le graphe de  $g$  ; (c) tracer les premiers termes de  $(u_n)$  ; (d) montrer que  $(u_n)$  est croissante ; (e) étudier la fonction  $g(x) = f(x) - x$  ; (f) montrer que  $f$  admet deux points fixes sur  $\mathbb{R}_+$ ,  $0 < \ell < \ell'$  ; (g) montrer que  $f([0, \ell]) \subset [0, \ell]$  ; (h) en déduire que  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .
24. Soit  $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ ,  $u_0 = 2$  et pour  $n \geq 0$  :  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Étudier en détail la suite  $(u_n)$ .
25. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :  $u_0 \in [0, 1]$  et  $u_{n+1} = u_n - u_n^2$ . Étudier en détail la suite  $(u_n)$ .
26. Étudier la suite définie par  $u_0 = 4$  et  $u_{n+1} = \frac{4}{u_n + 2}$ .

# Chapitre 2

## Limites et fonctions continues


### 1. Notions de fonction

#### 1.1. Définitions

##### Définition 8

Une **fonction** d'une variable réelle à valeurs réelles est une application  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ , où  $U$  est une partie de  $\mathbb{R}$ . En général,  $U$  est un intervalle ou une réunion d'intervalles. On appelle  $U$  le **domaine de définition** de la fonction  $f$ .


Le **graphe** d'une fonction  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  est la partie  $\Gamma_f$  de  $\mathbb{R}^2$  définie par  $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in U\}$ .



#### 1.2. Opérations sur les fonctions

Soient  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : U \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions définies sur une même partie  $U$  de  $\mathbb{R}$ . On peut alors définir les fonctions suivantes :

- la **somme** de  $f$  et  $g$  est la fonction  $f + g : U \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ ;
- le **produit** de  $f$  et  $g$  est la fonction  $f \times g : U \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$  ;
- la **multiplication par un scalaire**  $\lambda \in \mathbb{R}$  de  $f$  est  $\lambda \cdot f : U \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $(\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x)$ .



### 1.3. Fonctions majorées, minorées, bornées

#### Définition 9


Soient  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : U \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions. Alors :

- $f \geq g$  si  $\forall x \in U f(x) \geq g(x)$  ;
- $f \geq 0$  si  $\forall x \in U f(x) \geq 0$  ;
- $f > 0$  si  $\forall x \in U f(x) > 0$  ;
- $f$  est dite **constante** sur  $U$  si  $\exists a \in \mathbb{R} \forall x \in U f(x) = a$  ;
- $f$  est dite **nulle** sur  $U$  si  $\forall x \in U f(x) = 0$ .

#### Définition 10

Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. On dit que :

- $f$  est **majorée** sur  $U$  si  $\exists M \in \mathbb{R} \forall x \in U f(x) \leq M$  ;
- $f$  est **minorée** sur  $U$  si  $\exists m \in \mathbb{R} \forall x \in U f(x) \geq m$  ;
- $f$  est **bornée** sur  $U$  si  $f$  est à la fois majorée et minorée sur  $U$ , c'est-à-dire si  $\exists M \in \mathbb{R} \forall x \in U |f(x)| \leq M$ .




### 1.4. Fonctions croissantes, décroissantes

#### Définition 11

Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. On dit que :

- $f$  est **croissante** sur  $U$  si  $\forall x, y \in U \quad x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$
- $f$  est **strictement croissante** sur  $U$  si  $\forall x, y \in U \quad x < y \implies f(x) < f(y)$
- $f$  est **décroissante** sur  $U$  si  $\forall x, y \in U \quad x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$

- $f$  est **strictement décroissante** sur  $U$  si  $\forall x, y \in U \quad x < y \implies f(x) > f(y)$
- $f$  est **monotone** (resp. **strictement monotone**) sur  $U$  si  $f$  est croissante ou décroissante (resp. strictement croissante ou strictement décroissante) sur  $U$ .



**Exemple 11**

- La fonction racine carrée  $\begin{cases} [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{x} \end{cases}$  est strictement croissante.
- Les fonctions exponentielle  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et logarithme  $\ln : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  sont strictement croissantes.
- La fonction valeur absolue  $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x| \end{cases}$  n'est ni croissante, ni décroissante. Par contre, la fonction  $\begin{cases} [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x| \end{cases}$  est strictement croissante.

**1.5. Parité et périodicité**


**Définition 12**

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire de la forme  $]-a, a[$  ou  $[-a, a]$  ou  $\mathbb{R}$ ).  
 Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur cet intervalle. On dit que :

- $f$  est **paire** si  $\forall x \in I \quad f(-x) = f(x)$ ,
- $f$  est **impaire** si  $\forall x \in I \quad f(-x) = -f(x)$ .


**Interprétation graphique :**

- $f$  est paire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- $f$  est impaire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'origine.




**Exemple 12**

- La fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $x \mapsto x^{2n}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) est paire.
- La fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $x \mapsto x^{2n+1}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) est impaire.
- La fonction  $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est paire. La fonction  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est impaire.


**Définition 13**


Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T$  un nombre réel,  $T > 0$ . La fonction  $f$  est dite **périodique** de période  $T$  si  $\forall x \in \mathbb{R} f(x+T) = f(x)$ .



**Interprétation graphique** :  $f$  est périodique de période  $T$  si et seulement si son graphe est invariant par la translation de vecteur  $T\vec{i}$ , où  $\vec{i}$  est le premier vecteur de coordonnées.

**Exemple 13**

Les fonctions sinus et cosinus sont  $2\pi$ -périodiques. La fonction tangente est  $\pi$ -périodique.



## 2. Limites

### 2.1. Définitions

#### Limite en un point


Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ . Soit  $x_0 \in \mathbb{R}$  un point de  $I$  ou une extrémité de  $I$ .

#### Définition 14

Soit  $\ell \in \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  **a pour limite  $\ell$  en  $x_0$**  si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

On dit aussi que  $f(x)$  **tend vers  $\ell$  lorsque  $x$  tend vers  $x_0$** . On note alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$  ou bien  $\lim_{x_0} f = \ell$ .



#### Remarque

- L'inégalité  $|x - x_0| < \delta$  équivaut à  $x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ . L'inégalité  $|f(x) - \ell| < \varepsilon$  équivaut à  $f(x) \in ]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$ .
- On peut remplacer certaines inégalités strictes «  $<$  » par des inégalités larges «  $\leq$  » dans la définition :  $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$
- Dans la définition de la limite

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$



le quantificateur  $\forall x \in I$  n'est là que pour être sûr que l'on puisse parler de  $f(x)$ . Il est souvent omis et l'existence de la limite s'écrit alors juste :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

- N'oubliez pas que l'ordre des quantificateurs est important, on ne peut échanger le  $\forall \varepsilon$  avec le  $\exists \delta$  : le  $\delta$  dépend en général du  $\varepsilon$ . Pour marquer cette dépendance on peut écrire :  $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 \dots$

#### Exemple 14

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$  pour tout  $x_0 \geq 0$ ,
- la fonction partie entière  $E$  n'a pas de limite aux points  $x_0 \in \mathbb{Z}$ .



**Définition 15**

- On dit que  $f$  a pour limite  $+\infty$  en  $x_0$  si


$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \implies f(x) > A.$$

On note alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ .

- On dit que  $f$  a pour limite  $-\infty$  en  $x_0$  si

$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \implies f(x) < -A.$$

On note alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ .



**Limite en l'infini**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un intervalle de la forme  $I = ]a, +\infty[$ .

**Définition 16**

- Soit  $\ell \in \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $+\infty$  si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall x \in I \quad x > B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$


On note alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$  ou  $\lim_{+\infty} f = \ell$ .

- On dit que  $f$  a pour **limite**  $+\infty$  en  $+\infty$  si

$$\forall A > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall x \in I \quad x > B \implies f(x) > A.$$

On note alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

On définit de la même manière la limite en  $-\infty$  des fonctions définies sur les intervalles du type  $]-\infty, a[$ .



**Exemple 15**

On a les limites classiques suivantes pour tout  $n \geq 1$  :

$$\begin{aligned} - \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n &= \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \\ - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^n}\right) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^n}\right) &= 0. \end{aligned}$$

**Exemple 16**

Soit  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  avec  $a_n > 0$  et  $Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$  avec  $b_m > 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} +\infty & \text{si } n > m \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{si } n = m \\ 0 & \text{si } n < m \end{cases}$$

**Limite à gauche et à droite**

Soit  $f$  une fonction définie sur un ensemble de la forme  $]a, x_0[ \cup ]x_0, b[$ .

**Définition 17**

- On appelle **limite à droite** en  $x_0$  de  $f$  la limite de la fonction  $f|_{]x_0, b[}$  en  $x_0$  et on la note  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f$ .
- On définit de même la **limite à gauche** en  $x_0$  de  $f$  : la limite de la fonction  $f|_{]a, x_0[}$  en  $x_0$  et on la note  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f$ .
- On note aussi  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  pour la limite à droite et  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  pour la limite à gauche.

Dire que  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  admet une limite  $\ell \in \mathbb{R}$  à droite en  $x_0$  signifie donc :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$


Si la fonction  $f$  a une limite en  $x_0$ , alors ses limites à gauche et à droite en  $x_0$  coïncident et valent  $\lim_{x_0} f$ . Réciproquement, si  $f$  a une limite à gauche et une limite à droite en  $x_0$  et si ces limites valent  $f(x_0)$  (si  $f$  est bien définie en  $x_0$ ) alors  $f$  admet une limite en  $x_0$ .

**Exemple 17**

Considérons la fonction partie entière au point  $x = 2$  :

- comme pour tout  $x \in ]2, 3[$  on a  $E(x) = 2$ , on a  $\lim_{2^+} E = 2$ ,
- comme pour tout  $x \in [1, 2[$  on a  $E(x) = 1$ , on a  $\lim_{2^-} E = 1$ .

Ces deux limites étant différentes, on en déduit que  $E$  n'a pas de limite en 2.



**2.2. Propriétés**

**Proposition 15**

Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique.

On ne donne pas la démonstration de cette proposition, qui est très similaire à celle de l'unicité de la limite pour les suites (un raisonnement par l'absurde).

Soient deux fonctions  $f$  et  $g$ . On suppose que  $x_0$  est un réel, ou que  $x_0 = \pm\infty$ .

**Proposition 16**

Si  $\lim_{x_0} f = \ell \in \mathbb{R}$  et  $\lim_{x_0} g = \ell' \in \mathbb{R}$ , alors :

- $\lim_{x_0} (\lambda \cdot f) = \lambda \cdot \ell$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x_0} (f + g) = \ell + \ell'$
- $\lim_{x_0} (f \times g) = \ell \times \ell'$

- si  $\ell \neq 0$ , alors  $\lim_{x_0} \frac{1}{f} = \frac{1}{\ell}$

De plus, si  $\lim_{x_0} f = +\infty$  (ou  $-\infty$ ) alors  $\lim_{x_0} \frac{1}{f} = 0$ .

On a aussi

**Proposition 17**

Si  $\lim_{x_0} f = \ell$  et  $\lim_{\ell} g = \ell'$ , alors  $\lim_{x_0} g \circ f = \ell'$ .

Ce sont des propriétés que l'on a l'habitude d'utiliser !

**Exemple 18**

Soit  $x \mapsto u(x)$  une fonction,  $x_0 \in \mathbb{R}$  tel que  $u(x) \rightarrow 2$  lorsque  $x \rightarrow x_0$ . Posons  $f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{u(x)^2} + \ln u(x)}$ . Si elle existe, quelle est la limite de  $f$  en  $x_0$  ?

- Tout d'abord comme  $u(x) \rightarrow 2$  alors  $u(x)^2 \rightarrow 4$  donc  $\frac{1}{u(x)^2} \rightarrow \frac{1}{4}$  (lorsque  $x \rightarrow x_0$ ).
- De même comme  $u(x) \rightarrow 2$  alors dans un voisinage de  $x_0$   $u(x) > 0$  donc  $\ln u(x)$  est bien définie dans ce voisinage et de plus  $\ln u(x) \rightarrow \ln 2$  (lorsque  $x \rightarrow x_0$ ).
- Cela entraîne que  $1 + \frac{1}{u(x)^2} + \ln u(x) \rightarrow 1 + \frac{1}{4} + \ln 2$  lorsque  $x \rightarrow x_0$ . En particulier  $1 + \frac{1}{u(x)^2} + \ln u(x) \geq 0$  dans un voisinage de  $x_0$  donc  $f(x)$  est bien définie dans un voisinage de  $x_0$ .
- Et par composition avec la racine carrée alors  $f(x)$  a bien une limite en  $x_0$  et  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \ln 2}$ .

Il y a des situations où l'on ne peut rien dire sur les limites. Par exemple si  $\lim_{x_0} f = +\infty$  et  $\lim_{x_0} g = -\infty$  alors on ne peut a priori rien dire sur la limite de  $f + g$  (cela dépend vraiment de  $f$  et de  $g$ ). On raccourci cela en  $+\infty - \infty$  est une **forme indéterminée**.


Voici une liste de formes indéterminées :  $+\infty - \infty$  ;  $0 \times \infty$  ;  $\frac{\infty}{\infty}$  ;  $\frac{0}{0}$  ;  $1^\infty$  ;  $\infty^0$ .

Enfin voici une proposition très importante qui lie le comportement d'une limite avec les inégalités.

**Proposition 18**

- Si  $f \leq g$  et si  $\lim_{x_0} f = \ell \in \mathbb{R}$  et  $\lim_{x_0} g = \ell' \in \mathbb{R}$ , alors  $\ell \leq \ell'$ .
- Si  $f \leq g$  et si  $\lim_{x_0} f = +\infty$ , alors  $\lim_{x_0} g = +\infty$ .
- Théorème des gendarmes

Si  $f \leq g \leq h$  et si  $\lim_{x_0} f = \lim_{x_0} h = \ell \in \mathbb{R}$ , alors  $g$  a une limite en  $x_0$  et  $\lim_{x_0} g = \ell$ .



### 3. Continuité en un point

#### 3.1. Définition


Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

**Définition 18**

- On dit que  $f$  est **continue en un point**  $x_0 \in I$  si


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

- On dit que  $f$  est **continue sur**  $I$  si  $f$  est continue en tout point de  $I$ .



Intuitivement, une fonction est continue sur un intervalle, si on peut tracer son graphe « sans lever le crayon », c'est-à-dire si elle n'a pas de saut.

Voici des fonctions qui ne sont pas continues en  $x_0$  :



### Exemple 19

Les fonctions suivantes sont continues :

- une fonction constante sur un intervalle,
- la fonction racine carrée  $x \mapsto \sqrt{x}$  sur  $[0, +\infty[$ ,
- les fonctions sin et cos sur  $\mathbb{R}$ ,
- la fonction valeur absolue  $x \mapsto |x|$  sur  $\mathbb{R}$ ,
- la fonction exp sur  $\mathbb{R}$ ,
- la fonction ln sur  $]0, +\infty[$ .

Par contre, la fonction partie entière  $E$  n'est pas continue aux points  $x_0 \in \mathbb{Z}$ , puisqu'elle n'admet pas de limite en ces points. Pour  $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ , elle est continue en  $x_0$ .


## 3.2. Propriétés

La continuité assure par exemple que si la fonction n'est pas nulle en un point (qui est une propriété ponctuelle) alors elle n'est pas nulle autour de ce point (propriété locale). Voici l'énoncé :

### Lemme 1

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $x_0$  un point de  $I$ . Si  $f$  est continue en  $x_0$  et si  $f(x_0) \neq 0$ , alors il existe  $\delta > 0$  tel que

$$\forall x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \quad f(x) \neq 0$$



La continuité se comporte bien avec les opérations élémentaires. Les propositions suivantes sont des conséquences immédiates des propositions analogues sur les limites.

**Proposition 19**

Soient  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues en un point  $x_0 \in I$ . Alors

- $\lambda \cdot f$  est continue en  $x_0$  (pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ ),
- $f + g$  est continue en  $x_0$ ,
- $f \times g$  est continue en  $x_0$ ,
- si  $f(x_0) \neq 0$ , alors  $\frac{1}{f}$  est continue en  $x_0$ .

**Exemple 20**

La proposition précédente permet de vérifier que d'autres fonctions usuelles sont continues :

- les fonctions puissance  $x \mapsto x^n$  sur  $\mathbb{R}$  (comme produit  $x \times x \times \dots$ ),
- les polynômes sur  $\mathbb{R}$  (somme et produit de fonctions puissance et de fonctions constantes),
- les fractions rationnelles  $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$  sur tout intervalle où le polynôme  $Q(x)$  ne s'annule pas.

La composition conserve la continuité (mais il faut faire attention en quels points les hypothèses s'appliquent).

**Proposition 20**

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions telles que  $f(I) \subset J$ . Si  $f$  est continue en un point  $x_0 \in I$  et si  $g$  est continue en  $f(x_0)$ , alors  $g \circ f$  est continue en  $x_0$ .

**3.3. Prolongement par continuité**

**Définition 19**


Soit  $I$  un intervalle,  $x_0$  un point de  $I$  et  $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

- On dit que  $f$  est **prolongeable par continuité** en  $x_0$  si  $f$  admet une limite finie en  $x_0$ . Notons alors  $\ell = \lim_{x \rightarrow x_0} f$ .

- On définit alors la fonction  $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$  en posant pour tout  $x \in I$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0. \end{cases}$$

Alors  $\tilde{f}$  est continue en  $x_0$  et on l'appelle le **prolongement par continuité** de  $f$  en  $x_0$ .



Dans la pratique, on continuera souvent à noter  $f$  à la place de  $\tilde{f}$ .

**Exemple 21**

Considérons la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = x \sin(\frac{1}{x})$ . Voyons si  $f$  admet un prolongement par continuité en 0 ?

Comme pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$  on a  $|f(x)| \leq |x|$ , on en déduit que  $f$  tend vers 0 en 0. Elle est donc prolongeable par continuité en 0 et son prolongement est la fonction  $\tilde{f}$  définie sur  $\mathbb{R}$  tout entier par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$


## 4. Continuité sur un intervalle

### 4.1. Le théorème des valeurs intermédiaires

**Théorème 4 : Théorème des valeurs intermédiaires**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur un segment.

Pour tout réel  $y$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = y$ .




### 4.2. Applications du théorème des valeurs intermédiaires

Voici la version la plus utilisée du théorème des valeurs intermédiaires.

**Corollaire 1**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur un segment.

Si  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f(c) = 0$ .




### Démonstration

Il s'agit d'une application directe du théorème des valeurs intermédiaires avec  $y = 0$ . L'hypothèse  $f(a) \cdot f(b) < 0$  signifiant que  $f(a)$  et  $f(b)$  sont de signes contraires.

### Exemple 22

Tout polynôme de degré impair possède au moins une racine réelle.




En effet, un tel polynôme s'écrit  $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$  avec  $n$  un entier impair. On peut supposer que le coefficient  $a_n$  est strictement positif. Alors on a  $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ . En particulier, il existe deux réels  $a$  et  $b$  tels que  $f(a) < 0$  et  $f(b) > 0$  et on conclut grâce au corollaire précédent.

### Corollaire 2

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ . Alors  $f(I)$  est un intervalle.


Attention ! Il serait faux de croire que l'image par une fonction  $f$  de l'intervalle  $[a, b]$  soit l'intervalle  $[f(a), f(b)]$ .



### 4.3. Fonctions continues sur un segment

#### Théorème 5

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur un segment. Alors il existe deux réels  $m$  et  $M$  tels que  $f([a, b]) = [m, M]$ . Autrement dit, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment.



Comme on sait déjà par le théorème des valeurs intermédiaires que  $f([a, b])$  est un intervalle, le théorème précédent signifie exactement que

**Si  $f$  est continue sur  $[a, b]$  alors  $f$  est bornée sur  $[a, b]$  et elle atteint ses bornes.**

Donc  $m$  est le minimum de la fonction sur l'intervalle  $[a, b]$  alors que  $M$  est le maximum.

[[Preuve : à écrire]]

## 5. Fonctions monotones et bijections

### 5.1. Rappels : injection, surjection, bijection

Dans cette section nous rappelons le matériel nécessaire concernant les applications bijectives.

#### Définition 20

Soit  $f : E \rightarrow F$  une fonction, où  $E$  et  $F$  sont des parties de  $\mathbb{R}$ .


- $f$  est **injective** si  $\forall x, x' \in E \quad f(x) = f(x') \implies x = x'$  ;
- $f$  est **surjective** si  $\forall y \in F \quad \exists x \in E \quad y = f(x)$  ;
- $f$  est **bijective** si  $f$  est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire si  $\forall y \in F \quad \exists! x \in E \quad y = f(x)$ .

**Proposition 21**

Si  $f : E \rightarrow F$  est une fonction bijective alors il existe une unique application  $g : F \rightarrow E$  telle que  $g \circ f = \text{id}_E$  et  $f \circ g = \text{id}_F$ . La fonction  $g$  est la **bijection réciproque** de  $f$  et se note  $f^{-1}$ .

**Remarque**

- On rappelle que l'**identité**,  $\text{id}_E : E \rightarrow E$  est simplement définie par  $x \mapsto x$ .
- $g \circ f = \text{id}_E$  se reformule ainsi :  $\forall x \in E \quad g(f(x)) = x$ .
- Alors que  $f \circ g = \text{id}_F$  s'écrit :  $\forall y \in F \quad f(g(y)) = y$ .
- Dans un repère orthonormé les graphes des fonctions  $f$  et  $f^{-1}$  sont symétriques par rapport à la première bissectrice.


**5.2. Fonctions monotones et bijections**

Voici un résultat important qui permet d'obtenir des fonctions bijectives.

**Théorème 6 : Théorème de la bijection**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ . Si  $f$  est continue et strictement monotone sur  $I$ , alors

1.  $f$  établit une bijection de l'intervalle  $I$  dans l'intervalle image  $J = f(I)$ ,
2. la fonction réciproque  $f^{-1} : J \rightarrow I$  est continue et strictement monotone sur  $J$  et elle a le même sens de variation que  $f$ .

En pratique, si on veut appliquer ce théorème à une fonction continue  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , on découpe l'intervalle  $I$  en sous-intervalles sur lesquels la fonction  $f$  est strictement monotone.

**Exemple 23**

Soit  $n \geq 1$ . Soit  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow ]0, +\infty[$  définie par  $f(x) = x^n$ . Alors  $f$  est continue et strictement croissante. Comme  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$  alors  $f$  est une bijection. Sa bijection réciproque  $f^{-1}$  est notée :  $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$  (ou aussi  $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ ) : c'est la fonction racine  $n$ -ième. Elle est continue et strictement croissante.

## 5.3. Exercice

1. Déterminer, si elle existe, la limite de  $\frac{2x^2-x-2}{3x^2+2x+2}$  en 0. Et en  $+\infty$  ?
2. Déterminer, si elle existe, la limite de  $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$  en  $+\infty$ . Et pour  $\frac{\cos x}{\sqrt{x}}$  ?
3. En utilisant la définition de la limite (avec des  $\varepsilon$ ), montrer que  $\lim_{x \rightarrow 2}(3x+1) = 7$ .
4. Montrer que si  $f$  admet une limite finie en  $x_0$  alors il existe  $\delta > 0$  tel que  $f$  soit bornée sur  $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ .
5. Déterminer, si elle existe,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{x}$ . Et  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$  ?
6. Déterminer le domaine de définition et de continuité des fonctions suivantes :  $f(x) = 1/\sin x$ ,  $g(x) = 1/\sqrt{x + \frac{1}{2}}$ ,  $h(x) = \ln(x^2 + x - 1)$ .
7. Trouver les couples  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tels que la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = ax + b$  si  $x < 0$  et  $f(x) = \exp(x)$  si  $x \geq 0$  soit continue sur  $\mathbb{R}$ . Et si on avait  $f(x) = \frac{a}{x-1} + b$  pour  $x < 0$  ?
8. Soit  $f$  une fonction continue telle que  $f(x_0) = 1$ . Montrer qu'il existe  $\delta > 0$  tel que : pour tout  $x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$   $f(x) > \frac{1}{2}$ .
9. Étudier la continuité de  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :  $f(x) = \sin(x)\cos\left(\frac{1}{x}\right)$  si  $x \neq 0$  et  $f(0) = 0$ . Et pour  $g(x) = xE(x)$  ?
10. La fonction définie par  $f(x) = \frac{x^3+8}{|x+2|}$  admet-elle un prolongement par continuité en  $-2$  ?
11. Soit la suite définie par  $u_0 > 0$  et  $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$ . Montrer que  $(u_n)$  admet une limite  $\ell \in \mathbb{R}$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ . À l'aide de la fonction  $f(x) = \sqrt{x}$  calculer cette limite.
12. Soient  $P(x) = x^5 - 3x - 2$  et  $f(x) = x^{2^x} - 1$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$ . Montrer que l'équation  $P(x) = 0$  a au moins une racine dans  $[1, 2]$  ; l'équation  $f(x) = 0$  a au moins une racine dans  $[0, 1]$  ; l'équation  $P(x) = f(x)$  a au moins une racine dans  $]0, 2[$ .
13. Montrer qu'il existe  $x > 0$  tel que  $2^x + 3^x = 5^x$ .
14. Dessiner le graphe d'une fonction continue  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tel que  $f(\mathbb{R}) = [0, 1]$ . Puis  $f(\mathbb{R}) = ]0, 1[$  ;  $f(\mathbb{R}) = [0, 1[$  ;  $f(\mathbb{R}) = ]-\infty, 1]$ ,  $f(\mathbb{R}) = ]-\infty, 1[$ .
15. Soient  $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues. Quelles fonctions suivantes sont à coup sûr bornées :  $f + g$ ,  $f \times g$ ,  $f/g$  ?
16. Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur  $[0, 1]$  telles que  $\forall x \in [0, 1] f(x) < g(x)$ . Montrer qu'il existe  $m > 0$  tel que  $\forall x \in [0, 1] f(x) + m < g(x)$ . Ce résultat est-il vrai si on remplace  $[0, 1]$  par  $\mathbb{R}$  ?

# Chapitre 3

## Dérivée d'une fonction

### 1. Dérivée

#### 1.1. Dérivée en un point

Soit  $I$  un intervalle ouvert de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Soit  $x_0 \in I$ .

##### Définition 21

$f$  est **dérivable en**  $x_0$  si le **taux d'accroissement**  $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$  a une limite finie lorsque  $x$  tend vers  $x_0$ . La limite s'appelle alors le **nombre dérivé** de  $f$  en  $x_0$  et est noté  $f'(x_0)$ . Ainsi

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

##### Définition 22

$f$  est **dérivable sur**  $I$  si  $f$  est dérivable en tout point  $x_0 \in I$ . La fonction  $x \mapsto f'(x)$  est la **fonction dérivée** de  $f$ , elle se note  $f'$  ou  $\frac{df}{dx}$ .

##### Exemple 24

La fonction définie par  $f(x) = x^2$  est dérivable en tout point  $x_0 \in \mathbb{R}$ . En effet :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} = x + x_0 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 2x_0.$$

On a même montré que le nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$  est  $2x_0$ , autrement dit :  $f'(x) = 2x$ .

##### Exemple 25

Montrons que la dérivée de  $f(x) = \sin x$  est  $f'(x) = \cos x$ . Nous allons utiliser les deux assertions suivantes :

$$\frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \quad \text{et} \quad \sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p - q}{2} \cdot \cos \frac{p + q}{2}.$$

Remarquons déjà que la première assertion prouve  $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$  et donc  $f$  est dérivable en  $x_0 = 0$  et  $f'(0) = 1$ .

Pour  $x_0$  quelconque on écrit :


$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \cdot \cos \frac{x+x_0}{2}.$$

Lorsque  $x \rightarrow x_0$  alors d'une part  $\cos \frac{x+x_0}{2} \rightarrow \cos x_0$  et d'autre part en posant  $u = \frac{x-x_0}{2}$  alors  $u \rightarrow 0$  et on a  $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ . Ainsi  $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \rightarrow \cos x_0$  et donc  $f'(x) = \cos x$ .

## 1.2. Tangente

La droite qui passe par les points distincts  $(x_0, f(x_0))$  et  $(x, f(x))$  a pour coefficient directeur  $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ . À la limite on trouve que le coefficient directeur de la tangente est  $f'(x_0)$ . Une équation de la **tangente** au point  $(x_0, f(x_0))$  est donc :

$$y = (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0)$$



On a clairement d'après es la définition :


### Proposition 22

Soit  $I$  un intervalle ouvert,  $x_0 \in I$  et soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

- Si  $f$  est dérivable en  $x_0$  alors  $f$  est continue en  $x_0$ .
- Si  $f$  est dérivable sur  $I$  alors  $f$  est continue sur  $I$ .

### Remarque

La réciproque est **fausse** : par exemple, la fonction valeur absolue est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.



En effet, le taux d'accroissement de  $f(x) = |x|$  en  $x_0 = 0$  vérifie :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} +1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

Il y a bien une limite à droite (qui vaut +1), une limite à gauche (qui vaut -1) mais elles ne sont pas égales : il n'y a pas de limite en 0. Ainsi  $f$  n'est pas dérivable en  $x = 0$ .

Cela se lit aussi sur le dessin il y a une demi-tangente à droite, une demi-tangente à gauche mais elles ont des directions différentes.

## 2. Calcul des dérivées

### 2.1. Somme, produit,...

La proposition suivante est très pratique sa démonstration se fait par un calcul direct.

#### Proposition 23

Soient  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions dérivables sur  $I$ . Alors pour tout  $x \in I$  :

- $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ ,
- $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$  où  $\lambda$  est un réel fixé,
- $(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ ,
- $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$  (si  $f(x) \neq 0$ ),
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$  (si  $g(x) \neq 0$ ).

#### Remarque

Il est plus facile de mémoriser les égalités de fonctions :

$$(f + g)' = f' + g', \quad (\lambda f)' = \lambda f', \quad (f \times g)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

### 2.2. Dérivée de fonctions usuelles

Le tableau de gauche est un résumé des principales formules à connaître,  $x$  est une variable. Le tableau de droite est celui des compositions (voir paragraphe suivant),  $u$  représente une fonction  $x \mapsto u(x)$ .

Fonction	Dérivée
$x^n$	$nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z})$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$
$x^\alpha$	$\alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
$e^x$	$e^x$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Fonction	Dérivée
$u^n$	$nu'u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z})$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{u}$	$\frac{1}{2} \frac{u'}{\sqrt{u}}$
$u^\alpha$	$\alpha u' u^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
$e^u$	$u' e^u$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin u$	$u' \cos u$
$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$

**Remarque**

– Notez que les formules pour  $x^n$ ,  $\frac{1}{x} \sqrt{x}$  et  $x^\alpha$  sont aussi des conséquences de la dérivée de l'exponentielle. Par exemple  $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$  et donc

$$\frac{d}{dx}(x^\alpha) = \frac{d}{dx}(e^{\alpha \ln x}) = \alpha \frac{1}{x} e^{\alpha \ln x} = \alpha \frac{1}{x} x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}.$$

– Si vous devez dériver une fonction avec un exposant dépendant de  $x$  il faut absolument repasser à la forme exponentielle. Par exemple si  $f(x) = 2^x$  alors on réécrit d'abord  $f(x) = e^{x \ln 2}$  pour pouvoir calculer  $f'(x) = \ln 2 \cdot e^{x \ln 2} = \ln 2 \cdot 2^x$ .

**2.3. Composition****Proposition 24**

Si  $f$  est dérivable en  $x$  et  $g$  est dérivable en  $f(x)$  alors  $g \circ f$  est dérivable en  $x$  de dérivée :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

**Démonstration**

La preuve est similaire à celle ci-dessus pour le produit en écrivant cette fois :

$$\frac{g \circ f(x) - g \circ f(x_0)}{x - x_0} = \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \times \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(f(x_0)) \times f'(x_0).$$

**Exemple 26**

Calculons la dérivée de  $\ln(1+x^2)$ . Nous avons  $g(x) = \ln(x)$  avec  $g'(x) = \frac{1}{x}$  ; et  $f(x) = 1+x^2$  avec  $f'(x) = 2x$ . Alors la dérivée de  $\ln(1+x^2) = g \circ f(x)$  est

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = g'(1+x^2) \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^2}.$$

On a aussi

**Proposition 25**

Soit  $I$  un intervalle ouvert. Soit  $f : I \rightarrow J$  dérivable et bijective dont on note  $f^{-1} : J \rightarrow I$  la bijection réciproque. Si  $f'$  ne s'annule pas sur  $I$  alors  $f^{-1}$  est dérivable et on a pour tout  $x \in J$  :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

**Exemple 27**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $f(x) = x + \exp(x)$ . Étudions  $f$  en détail.

Tout d'abord :

1.  $f$  est dérivable car  $f$  est la somme de deux fonctions dérivables. En particulier  $f$  est continue.
2.  $f$  est strictement croissante car  $f$  est la somme de deux fonctions strictement croissantes.


- 3.  $f$  est une bijection car  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .
- 4.  $f'(x) = 1 + \exp(x)$  ne s'annule jamais (pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ).

Notons  $g = f^{-1}$  la bijection réciproque de  $f$ . Même si on ne sait pas a priori exprimer  $g$ , on peut malgré tout connaître des informations sur cette fonction : par le corollaire ci-dessus  $g$  est dérivable et l'on calcule  $g'$  en dérivant l'égalité  $f(g(x)) = x$ . Ce qui donne  $f'(g(x)) \cdot g'(x) = 1$  et donc ici

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{1 + \exp(g(x))}.$$

Pour cette fonction  $f$  particulière on peut préciser davantage : comme  $f(g(x)) = x$  alors  $g(x) + \exp(g(x)) = x$  donc  $\exp(g(x)) = x - g(x)$ . Cela conduit à :

$$g'(x) = \frac{1}{1 + x - g(x)}.$$



Par exemple  $f(0) = 1$  donc  $g(1) = 0$  et donc  $g'(1) = \frac{1}{2}$ . Autrement dit  $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$ . L'équation de la tangente au graphe de  $f^{-1}$  au point d'abscisse  $x_0 = 1$  est donc  $y = \frac{1}{2}(x - 1)$ .

### 2.4. Dérivées successives

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable et soit  $f'$  sa dérivée. Si la fonction  $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$  est aussi dérivable on note  $f'' = (f')'$  la **dérivée seconde** de  $f$ . Plus généralement on note :

$$f^{(0)} = f, \quad f^{(1)} = f', \quad f^{(2)} = f'' \quad \text{et} \quad f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Si la **dérivée n-ième**  $f^{(n)}$  existe on dit que  $f$  est **n fois dérivable**.

#### Théorème 7 : Formule de Leibniz

$$(f \cdot g)^{(n)} = f^{(n)} \cdot g + \binom{n}{1} f^{(n-1)} \cdot g^{(1)} + \dots + \binom{n}{k} f^{(n-k)} \cdot g^{(k)} + \dots + f \cdot g^{(n)}$$

Autrement dit :

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} \cdot g^{(k)}.$$

La démonstration est similaire à celle de la formule du binôme de Newton et les coefficients que l'on obtient sont les mêmes.

### Exemple 28

- Pour  $n = 1$  on retrouve  $(f \cdot g)' = f'g + fg'$ .
- Pour  $n = 2$ , on a  $(f \cdot g)'' = f''g + 2f'g' + fg''$ .

## 3. Extremum local, théorème de Rolle

### 3.1. Extremum local

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ .


#### Définition 23

- On dit que  $x_0$  est un **point critique** de  $f$  si  $f'(x_0) = 0$ .
- On dit que  $f$  admet un **maximum local en**  $x_0$  (resp. un **minimum local en**  $x_0$ ) s'il existe un intervalle ouvert  $J$  contenant  $x_0$  tel que

$$\text{pour tout } x \in I \cap J \quad f(x) \leq f(x_0)$$

(resp.  $f(x) \geq f(x_0)$ ).

- On dit que  $f$  admet un **extremum local en**  $x_0$  si  $f$  admet un maximum local ou un minimum local en ce point.




Dire que  $f$  a un maximum local en  $x_0$  signifie que  $f(x_0)$  est la plus grande des valeurs  $f(x)$  pour les  $x$  proches de  $x_0$ . On dit que  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  admet un **maximum global** en  $x_0$  si pour toutes les autres valeurs  $f(x)$ ,  $x \in I$  on a  $f(x) \leq f(x_0)$  (on ne regarde donc pas seulement les  $f(x)$  pour  $x$  proche de  $x_0$ ). Bien sûr un maximum global est aussi un maximum local, mais la réciproque est fautive.

#### Théorème 8

Soit  $I$  un intervalle ouvert et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable. Si  $f$  admet un maximum local (ou un minimum local) en  $x_0$  alors  $f'(x_0) = 0$ .


En d'autres termes, un maximum local (ou un minimum local)  $x_0$  est toujours un point critique. Géométriquement, au point  $(x_0, f(x_0))$  la tangente au graphe est horizontale.



**Remarque**

1. La réciproque du théorème 8 est fautive. Par exemple la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , définie par  $f(x) = x^3$  vérifie  $f'(0) = 0$  mais  $x_0 = 0$  n'est ni maximum local ni un minimum local.
2. L'intervalle du théorème 8 est ouvert. Pour le cas d'un intervalle fermé, il faut faire attention aux extrémités. Par exemple si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction dérivable qui admet un extremum en  $x_0$ , alors on est dans l'une des situations suivantes :
  - $x_0 = a$ ,
  - $x_0 = b$ ,
  - $x_0 \in ]a, b[$  et dans ce cas on a bien  $f'(x_0) = 0$  par le théorème 8.

Aux extrémités on ne peut rien dire pour  $f'(a)$  et  $f'(b)$ , comme le montre les différents maximums sur les dessins suivants.



3. Pour déterminer  $\max_{[a,b]} f$  et  $\min_{[a,b]} f$  (où  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction dérivable) il faut comparer les valeurs de  $f$  aux différents points critiques et en  $a$  et en  $b$ .

**Démonstration : Preuve du théorème**

Supposons que  $x_0$  soit un maximum local de  $f$ , soit donc  $J$  l'intervalle ouvert de la définition contenant  $x_0$  tel que pour tout  $x \in I \cap J$  on a  $f(x) \leq f(x_0)$ .

- Pour  $x \in I \cap J$  tel que  $x < x_0$  on a  $f(x) - f(x_0) \leq 0$  et  $x - x_0 < 0$  donc  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$  et donc à la limite  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ .
- Pour  $x \in I \cap J$  tel que  $x > x_0$  on a  $f(x) - f(x_0) \leq 0$  et  $x - x_0 > 0$  donc  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$  et donc à la limite  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ .

Or  $f$  est dérivable en  $x_0$  donc

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

La première limite est positive, la seconde est négative, la seule possibilité est que  $f'(x_0) = 0$ .


### 3.2. Théorème de Rolle

#### Théorème 9 : Théorème de Rolle

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  telle que

- $f$  est continue sur  $[a, b]$ ,
- $f$  est dérivable sur  $]a, b[$ ,
- $f(a) = f(b)$ .

Alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f'(c) = 0$ .



Interprétation géométrique : il existe au moins un point du graphe de  $f$  où la tangente est horizontale.

#### Démonstration

Tout d'abord, si  $f$  est constante sur  $[a, b]$  alors n'importe quel  $c \in ]a, b[$  convient. Sinon il existe  $x_0 \in [a, b]$  tel que  $f(x_0) \neq f(a)$ . Supposons par exemple  $f(x_0) > f(a)$ . Alors  $f$  est continue sur l'intervalle fermé et borné  $[a, b]$ , donc elle admet un maximum en un point  $c \in [a, b]$ . Mais  $f(c) \geq f(x_0) > f(a)$  donc  $c \neq a$ . De même comme  $f(a) = f(b)$  alors  $c \neq b$ . Ainsi  $c \in ]a, b[$ . En  $c$ ,  $f$  est donc dérivable et admet un maximum (local) donc  $f'(c) = 0$ .


## 4. Théorème des accroissements finis

### 4.1. Théorème des accroissements finis

#### Théorème 10 : Théorème des accroissements finis

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . Il existe  $c \in ]a, b[$  tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$



Interprétation géométrique : il existe au moins un point du graphe de  $f$  où la tangente est parallèle à la droite  $(AB)$  où  $A = (a, f(a))$  et  $B = (b, f(b))$ .

### Démonstration

Posons  $\ell = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  et  $g(x) = f(x) - \ell \cdot (x - a)$ . Alors  $g(a) = f(a)$ ,  $g(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (b - a) = f(a)$ . Par le théorème de Rolle, il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $g'(c) = 0$ . Or  $g'(x) = f'(x) - \ell$ . Ce qui donne  $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ .

## 4.2. Fonction croissante et dérivée

### Corollaire 3

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ .

1.  $\forall x \in ]a, b[ \quad f'(x) \geq 0 \iff f$  est croissante ;
2.  $\forall x \in ]a, b[ \quad f'(x) \leq 0 \iff f$  est décroissante ;
3.  $\forall x \in ]a, b[ \quad f'(x) = 0 \iff f$  est constante ;
4.  $\forall x \in ]a, b[ \quad f'(x) > 0 \implies f$  est strictement croissante ;
5.  $\forall x \in ]a, b[ \quad f'(x) < 0 \implies f$  est strictement décroissante.

### Remarque

La réciproque au point (4) (et aussi au (5)) est fautive. Par exemple la fonction  $x \mapsto x^3$  est strictement croissante et pourtant sa dérivée s'annule en 0.

### Démonstration

Prouvons par exemple (1).

Sens  $\implies$ . Supposons d'abord la dérivée positive. Soient  $x, y \in ]a, b[$  avec  $x \leq y$ . Alors par le théorème des accroissements finis, il existe  $c \in ]x, y[$  tel que  $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$ . Mais  $f'(c) \geq 0$  et  $x - y \leq 0$  donc  $f(x) - f(y) \leq 0$ . Cela implique que  $f(x) \leq f(y)$ . Ceci étant vrai pour tout  $x, y$  alors  $f$  est croissante.

Sens  $\impliedby$ . Réciproquement, supposons que  $f$  est croissante. Fixons  $x \in ]a, b[$ . Pour tout  $y > x$  nous avons  $y - x > 0$  et  $f(y) - f(x) \geq 0$ , ainsi le taux d'accroissement vérifie  $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq 0$ . À la limite, quand  $y \rightarrow x$ , ce taux d'accroissement tend vers la dérivée de  $f$  en  $x$  et donc  $f'(x) \geq 0$ .

## 4.3. Inégalité des accroissements finis

### Corollaire 4 : Inégalité des accroissements finis

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$  ouvert. S'il existe une constante  $M$  tel que pour tout  $x \in I$ ,  $|f'(x)| \leq M$  alors

$$\forall x, y \in I \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

### Démonstration

Fixons  $x, y \in I$ , il existe alors  $c \in ]x, y[$  ou  $]y, x[$  tel que  $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$  et comme  $|f'(c)| \leq M$  alors  $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ .

**Exemple 29**

Soit  $f(x) = \sin(x)$ . Comme  $f'(x) = \cos x$  alors  $|f'(x)| \leq 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . L'inégalité des accroissements finis s'écrit alors :

$$\text{pour tous } x, y \in \mathbb{R} \quad |\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

En particulier si l'on fixe  $y = 0$  alors on obtient

$$|\sin x| \leq |x|$$

**4.4. Règle de l'Hospital****Corollaire 5 : Règle de l'Hospital**

Soient  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions dérivables et soit  $x_0 \in I$ . On suppose que

- $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ,
- $\forall x \in I \setminus \{x_0\} \quad g'(x) \neq 0$ .

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \quad (\ell \in \mathbb{R}) \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

**Exemple 30**

Calculer la limite en 1 de  $\frac{\ln(x^2+x-1)}{\ln(x)}$ . On vérifie que :

- $f(x) = \ln(x^2 + x - 1)$ ,  $f(1) = 0$ ,  $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-1}$ ,
- $g(x) = \ln(x)$ ,  $g(1) = 0$ ,  $g'(x) = \frac{1}{x}$ ,
- Prenons  $I = ]0, 1[$ ,  $x_0 = 1$ , alors  $g'$  ne s'annule pas sur  $I \setminus \{x_0\}$ .

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \times x = \frac{2x^2+x}{x^2+x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Donc

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

**5. Exercices**

1. Montrer que la fonction  $f(x) = x^3$  est dérivable en tout point  $x_0 \in \mathbb{R}$  et que  $f'(x_0) = 3x_0^2$ .
2. Montrer que la fonction  $f(x) = \sqrt{x}$  est dérivable en tout point  $x_0 > 0$  et que  $f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$ .
3. Montrer que la fonction  $f(x) = \sqrt{x}$  (qui est continue en  $x_0 = 0$ ) n'est pas dérivable en  $x_0 = 0$ .
4. Calculer l'équation de la tangente  $(T_0)$  à la courbe d'équation  $y = x^3 - x^2 - x$  au point d'abscisse  $x_0 = 2$ . Calculer  $x_1$  afin que la tangente  $(T_1)$  au point d'abscisse  $x_1$  soit parallèle à  $(T_0)$ .
5. Montrer que si une fonction  $f$  est paire et dérivable, alors  $f'$  est une fonction impaire.
6. Calculer les dérivées des fonctions suivantes :  $f_1(x) = x \ln x$ ,  $f_2(x) = \sin \frac{1}{x}$ ,  $f_3(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x^2}}$ ,  $f_4(x) = \left(\ln \frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{3}}$ ,  $f_5(x) = x^x$ ,  $f_6(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ .

7. On note  $\Delta(f) = \frac{f'}{f}$ . Calculer  $\Delta(f \times g)$ .
8. Soit  $f : ]1, +\infty[ \rightarrow ]-1, +\infty[$  définie par  $f(x) = x \ln(x) - x$ . Montrer que  $f$  est une bijection. Notons  $g = f^{-1}$ . Calculer  $g(0)$  et  $g'(0)$ .
9. Calculer les dérivées successives de  $f(x) = \ln(1+x)$ .
10. Calculer les dérivées successives de  $f(x) = \ln(x) \cdot x^3$ .
11. Dessiner le graphe de fonctions vérifiant :  $f_1$  admet deux minimums locaux et un maximum local ;  $f_2$  admet un minimum local qui n'est pas global et un maximum local qui est global ;  $f_3$  admet une infinité d'extremum locaux ;  $f_4$  n'admet aucun extremum local.
12. Calculer en quel point la fonction  $f(x) = ax^2 + bx + c$  admet un extremum local.
13. Soit  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction deux fois dérivable telle que  $f(0) = f(1) = f(2) = 0$ . Montrer qu'il existe  $c_1, c_2$  tels que  $f'(c_1) = 0$  et  $f'(c_2) = 0$ . Montrer qu'il existe  $c_3$  tel que  $f''(c_3) = 0$ .
14. Montrer que chacune des trois hypothèses du théorème de Rolle est nécessaire.
15. Soit  $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 2$ . Étudier la fonction  $f$ . Tracer son graphe. Montrer que  $f$  admet un minimum local et un maximum local.
16. Soit  $f(x) = \sqrt{x}$ . Appliquer le théorème des accroissements finis sur l'intervalle  $[100, 101]$ . En déduire l'encadrement  $10 + \frac{1}{22} \leq \sqrt{101} \leq 10 + \frac{1}{20}$ .
17. Appliquer le théorème des accroissements finis pour montrer que  $\ln(1+x) - \ln(x) < \frac{1}{x}$  (pour tout  $x > 0$ ).
18. Soit  $f(x) = e^x$ . Que donne l'inégalité des accroissements finis sur  $[0, x]$  ?
19. Appliquer la règle de l'Hospital pour calculer les limites suivantes (quand  $x \rightarrow 0$ ) :  $\frac{x}{(1+x)^n - 1}$  ;  
 $\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}}$  ;  $\frac{1 - \cos x}{\tan x}$  ;  $\frac{x - \sin x}{x^3}$ .

# Chapitre 4

## Développements limités

Dans ce chapitre, pour n'importe quelle fonction, nous allons trouver le polynôme de degré  $n$  qui approche le mieux la fonction. Les résultats ne sont valables que pour  $x$  autour d'une valeur fixée (ce sera souvent autour de 0). Ce polynôme sera calculé à partir des dérivées successives au point considéré. Sans plus attendre, voici la formule, dite formule de Taylor-Young :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x).$$

La partie polynomiale  $f(0) + f'(0)x + \dots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!}$  est le polynôme de degré  $n$  qui approche le mieux  $f(x)$  autour de  $x = 0$ . La partie  $x^n \varepsilon(x)$  est le «reste» dans lequel  $\varepsilon(x)$  est une fonction qui tend vers 0 (quand  $x$  tend vers 0) et qui est négligeable devant la partie polynomiale.

### 1. Formules de Taylor

Nous allons voir trois formules de Taylor, elles auront toutes la même partie polynomiale mais donnent plus ou moins d'informations sur le reste. Nous commencerons par la formule de Taylor avec reste intégral qui donne une expression exacte du reste. Puis la formule de Taylor avec reste  $f^{(n+1)}(c)$  qui permet d'obtenir un encadrement du reste et nous terminons avec la formule de Taylor-Young très pratique si l'on n'a pas besoin d'information sur le reste.

Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert. Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on dit que  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction de **classe**  $\mathcal{C}^n$  si  $f$  est  $n$  fois dérivable sur  $I$  et  $f^{(n)}$  est continue.  $f$  est de **classe**  $\mathcal{C}^0$  si  $f$  est continue sur  $I$ .  $f$  est de **classe**  $\mathcal{C}^\infty$  si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

#### 1.1. Formule de Taylor avec reste intégral

##### **Théorème 11 : Formule de Taylor avec reste intégral**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) et soit  $a, x \in I$ . Alors

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt.$$

Nous noterons  $T_n(x)$  la partie polynomiale de la formule de Taylor (elle dépend de  $n$  mais aussi de  $f$  et  $a$ ) :

$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

**Remarque**

En écrivant  $x = a + h$  (et donc  $h = x - a$ ) la formule de Taylor précédente devient (pour tout  $a$  et  $a + h$  de  $I$ ) :

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \int_0^h \frac{f^{(n+1)}(a+t)}{n!}(h-t)^n dt$$

**Exemple 31**

La fonction  $f(x) = \exp x$  est de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  sur  $I = \mathbb{R}$  pour tout  $n$ . Fixons  $a \in \mathbb{R}$ . Comme  $f'(x) = \exp x$ ,  $f''(x) = \exp x, \dots$  alors pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\exp x = \exp a + \exp a \cdot (x - a) + \dots + \frac{\exp a}{n!}(x - a)^n + \int_a^x \frac{\exp t}{n!}(x - t)^n dt.$$

Bien sûr si l'on se place en  $a = 0$  alors on retrouve le début de notre approximation de la fonction exponentielle en  $x = 0$  :  $\exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

**1.2. Formule de Taylor avec reste  $f^{(n+1)}(c)$**

**Théorème 12 : Formule de Taylor avec reste  $f^{(n+1)}(c)$**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) et soit  $a, x \in I$ . Il existe un réel  $c$  entre  $a$  et  $x$  tel que :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}.$$

**Exemple 32**

Soient  $a, x \in \mathbb{R}$ . Pour tout entier  $n \geq 0$  il existe  $c$  entre  $a$  et  $x$  tel que  $\exp x = \exp a + \exp a \cdot (x - a) + \dots + \frac{\exp a}{n!}(x - a)^n + \frac{\exp c}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$ .

Dans la plupart des cas on ne connaîtra pas ce  $c$ . Mais ce théorème permet d'encadrer le reste. Ceci s'exprime par le corollaire suivant :

**Corollaire 6**

Si en plus la fonction  $|f^{(n+1)}|$  est majorée sur  $I$  par un réel  $M$ , alors pour tout  $a, x \in I$ , on a :

$$|f(x) - T_n(x)| \leq M \frac{|x - a|^{n+1}}{(n + 1)!}.$$

**Exemple 33**

Approximation de  $\sin(0,01)$ .

Soit  $f(x) = \sin x$ . Alors  $f'(x) = \cos x$ ,  $f''(x) = -\sin x$ ,  $f^{(3)}(x) = -\cos x$ ,  $f^{(4)}(x) = \sin x$ . On obtient donc  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 1$ ,  $f''(0) = 0$ ,  $f^{(3)}(0) = -1$ . La formule de Taylor ci-dessus en  $a = 0$  à l'ordre 3 devient :  $f(x) = 0 + 1 \cdot x + 0 \cdot \frac{x^2}{2!} - 1 \cdot \frac{x^3}{3!} + f^{(4)}(c) \frac{x^4}{4!}$ , c'est-à-dire  $f(x) = x - \frac{x^3}{6} + f^{(4)}(c) \frac{x^4}{24}$ , pour un certain  $c$  entre 0 et  $x$ .

Appliquons ceci pour  $x = 0,01$ . Le reste étant petit on trouve alors

$$\sin(0,01) \approx 0,01 - \frac{(0,01)^3}{6} = 0,00999983333\dots$$

On peut même savoir quelle est la précision de cette approximation : comme  $f^{(4)}(x) = \sin x$  alors  $|f^{(4)}(c)| \leq 1$ . Donc  $|f(x) - (x - \frac{x^3}{6})| \leq \frac{x^4}{4!}$ . Pour  $x = 0,01$  cela donne :  $|\sin(0,01) - (0,01 - \frac{(0,01)^3}{6})| \leq \frac{(0,01)^4}{24}$ . Comme  $\frac{(0,01)^4}{24} \approx 4,16 \cdot 10^{-10}$  alors notre approximation donne au moins 8 chiffres exacts après la virgule.

### 1.3. Formule de Taylor-Young

#### Théorème 13 : Formule de Taylor-Young

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^n$  et soit  $a \in I$ . Alors pour tout  $x \in I$  on a :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon(x),$$

où  $\varepsilon$  est une fonction définie sur  $I$  telle que  $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ .

### 1.4. Un exemple


Soit  $f : ]-1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(1+x)$ ;  $f$  est infiniment dérivable. Nous allons calculer les formules de Taylor en 0 pour les premiers ordres.

Tous d'abord  $f(0) = 0$ . Ensuite  $f'(x) = \frac{1}{1+x}$  donc  $f'(0) = 1$ . Ensuite  $f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$  donc  $f''(0) = -1$ . Puis  $f^{(3)}(x) = +2\frac{1}{(1+x)^3}$  donc  $f^{(3)}(0) = +2$ . Par récurrence on montre que  $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!\frac{1}{(1+x)^n}$  et donc  $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$ . Ainsi pour  $n > 0$  :  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{n!}x^n = (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ .

Voici donc les premiers polynômes de Taylor :

$$T_0(x) = 0 \quad T_1(x) = x \quad T_2(x) = x - \frac{x^2}{2} \quad T_3(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

Les formules de Taylor nous disent que les restes sont de plus en plus petits lorsque  $n$  croît. Sur le dessins les graphes des polynômes  $T_0, T_1, T_2, T_3$  s'approchent de plus en plus du graphe de  $f$ . Attention ceci n'est vrai qu'autour de 0.



Pour  $n$  quelconque nous avons calculer que le polynôme de Taylor en 0 est

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.$$

**Notation.** Le terme  $(x-a)^n \varepsilon(x)$  où  $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$  est souvent abrégé en «*petit o*» de  $(x-a)^n$  et est noté  $o((x-a)^n)$ . Donc  $o((x-a)^n)$  est une fonction telle que  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{o((x-a)^n)}{(x-a)^n} = 0$ . Il faut s'habituer à cette notation qui simplifie les écritures, mais il faut toujours garder à l'esprit ce qu'elle signifie.

**Cas particulier : Formule de Taylor-Young au voisinage de 0.** On se ramène souvent au cas particulier où  $a = 0$ , la formule de Taylor-Young s'écrit alors

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x)$$

où  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$ .

Et avec la notation «*petit o*» cela donne :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

## 2. Développements limités au voisinage d'un point

### 2.1. Définition et existence

Soit  $I$  un intervalle ouvert et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction quelconque.

#### Définition 24

Pour  $a \in I$  et  $n \in \mathbb{N}$ , on dit que  $f$  admet un **développement limité (DL)** au point  $a$  et à l'ordre  $n$ , s'il existe des réels  $c_0, c_1, \dots, c_n$  et une fonction  $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$  de sorte que pour tout  $x \in I$  :

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \cdots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon(x).$$

- L'égalité précédente s'appelle un DL de  $f$  au voisinage de  $a$  à l'ordre  $n$ .
- Le terme  $c_0 + c_1(x-a) + \cdots + c_n(x-a)^n$  est appelé la **partie polynomiale** du DL.
- Le terme  $(x-a)^n \varepsilon(x)$  est appelé le **reste** du DL.

La formule de Taylor-Young permet d'obtenir immédiatement des développements limités en posant  $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$  :

#### Proposition 26

Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  au voisinage d'un point  $a$  alors  $f$  admet un DL au point  $a$  à l'ordre  $n$ , qui provient de la formule de Taylor-Young :

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon(x)$$

où  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ .

#### Remarque

1. Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  au voisinage d'un point 0, un DL en 0 à l'ordre  $n$  est l'expression :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x)$$

2. Si  $f$  admet un DL en un point  $a$  à l'ordre  $n$  alors elle en possède un pour tout  $k \leq n$ .

## 2.2. Unicité

### Proposition 27

Si  $f$  admet un DL alors ce DL est unique.

### Démonstration

Écrivons deux DL de  $f : f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon_1(x)$  et  $f(x) = d_0 + d_1(x-a) + \dots + d_n(x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon_2(x)$ . En effectuant la différence on obtient :

$$(d_0 - c_0) + (d_1 - c_1)(x-a) + \dots + (d_n - c_n)(x-a)^n + (x-a)^n(\varepsilon_2(x) - \varepsilon_1(x)) = 0.$$

Lorsque l'on fait  $x = a$  dans cette égalité alors on trouve  $d_0 - c_0 = 0$ . Ensuite on peut diviser cette égalité par  $x - a : (d_1 - c_1) + (d_2 - c_2)(x-a) + \dots + (d_n - c_n)(x-a)^{n-1} + (x-a)^{n-1}(\varepsilon_2(x) - \varepsilon_1(x)) = 0$ . En évaluant en  $x = a$  on obtient  $d_1 - c_1 = 0$ , etc. On trouve  $c_0 = d_0, c_1 = d_1, \dots, c_n = d_n$ . Les parties polynomiales sont égales et donc les restes aussi.

### Corollaire 7

Si  $f$  est paire (resp. impaire) alors la partie polynomiale de son DL en 0 ne contient que des monômes de degrés pairs (resp. impairs).

Par exemple  $x \mapsto \cos x$  est paire et nous verrons que son DL en 0 commence par :  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$ .

### Remarque

1. L'unicité du DL et la formule de Taylor-Young prouve que si l'on connaît le DL et que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  alors on peut calculer les nombres dérivés à partir de la partie polynomiale par la formule  $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$ . Cependant dans la majorité des cas on fera l'inverse : on trouve le DL à partir des dérivées.
2. Si  $f$  est continue et admet un DL en un point  $a$  à l'ordre  $n \geq 0$  alors  $c_0 = f(a)$ .
3. Si  $f$  admet un DL en un point  $a$  à l'ordre  $n \geq 1$ , alors  $f$  est dérivable en  $a$  et on a  $c_0 = f(a)$  et  $c_1 = f'(a)$ . Par conséquent  $y = c_0 + c_1(x-a)$  est l'équation de la tangente au graphe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .

## 2.3. DL des fonctions usuelles à l'origine

Les DL suivants en 0 proviennent de la formule de Taylor-Young.

$$\begin{aligned} \exp x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x) \\ \operatorname{ch} x &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \\ \operatorname{sh} x &= \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2} \varepsilon(x) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \\ \sin x &= \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2} \varepsilon(x) \end{aligned}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + x^n \varepsilon(x)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n n!} x^n + x^n \varepsilon(x)$$

Ils ne sont pas tous à apprendre par cœur. Certain sont conséquence des autres. A vous de voir comment.

### 2.4. DL des fonctions en un point quelconque

La fonction  $f$  admet un DL au voisinage d'un point  $a$  si et seulement si la fonction  $x \mapsto f(x+a)$  admet un DL au voisinage de 0. Souvent on ramène donc le problème en 0 en faisant le changement de variables  $h = x - a$ .

#### Exemple 34

1. DL de  $f(x) = \exp x$  en 1.

On pose  $h = x - 1$ . Si  $x$  est proche de 1 alors  $h$  est proche de 0. Nous allons nous ramener à un DL de  $\exp h$  en  $h = 0$ . On note  $e = \exp 1$ .

$$\begin{aligned} \exp x &= \exp(1+(x-1)) = \exp(1)\exp(x-1) = e \exp h = e \left( 1 + h + \frac{h^2}{2!} + \dots + \frac{h^n}{n!} + h^n \varepsilon(h) \right) \\ &= e \left( 1 + (x-1) + \frac{(x-1)^2}{2!} + \dots + \frac{(x-1)^n}{n!} + (x-1)^n \varepsilon(x-1) \right), \quad \lim_{x \rightarrow 1} \varepsilon(x-1) = 0. \end{aligned}$$

2. DL de  $g(x) = \sin x$  en  $\pi/2$ .

Sachant  $\sin x = \sin(\frac{\pi}{2} + x - \frac{\pi}{2}) = \cos(x - \frac{\pi}{2})$  on se ramène au DL de  $\cos h$  quand  $h = x - \frac{\pi}{2} \rightarrow 0$ . On a donc  $\sin x = 1 - \frac{(x-\frac{\pi}{2})^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{(x-\frac{\pi}{2})^{2n}}{(2n)!} + (x - \frac{\pi}{2})^{2n+1} \varepsilon(x - \frac{\pi}{2})$ , où  $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \varepsilon(x - \frac{\pi}{2}) = 0$ .

3. DL de  $\ell(x) = \ln(1+3x)$  en 1 à l'ordre 3.

Il faut se ramener à un DL du type  $\ln(1+h)$  en  $h = 0$ . On pose  $h = x - 1$  (et donc  $x = 1 + h$ ).

On a  $\ell(x) = \ln(1+3x) = \ln(1+3(1+h)) = \ln(4+3h) = \ln(4 \cdot (1 + \frac{3h}{4})) = \ln 4 + \ln(1 + \frac{3h}{4}) = \ln 4 + \frac{3h}{4} - \frac{1}{2}(\frac{3h}{4})^2 + \frac{1}{3}(\frac{3h}{4})^3 + h^3 \varepsilon(h) = \ln 4 + \frac{3(x-1)}{4} - \frac{9}{32}(x-1)^2 + \frac{9}{64}(x-1)^3 + (x-1)^3 \varepsilon(x-1)$  où  $\lim_{x \rightarrow 1} \varepsilon(x-1) = 0$ .

## 3. Opérations sur les développements limités

### 3.1. Somme et produit

On suppose que  $f$  et  $g$  sont deux fonctions qui admettent des DL en 0 à l'ordre  $n$  :

$$f(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + x^n \varepsilon_1(x) \quad g(x) = d_0 + d_1 x + \dots + d_n x^n + x^n \varepsilon_2(x)$$

#### Proposition 28

-  $f + g$  admet un DL en 0 l'ordre  $n$  qui est :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = (c_0 + d_0) + (c_1 + d_1)x + \dots + (c_n + d_n)x^n + x^n \varepsilon(x).$$

–  $f \times g$  admet un DL en 0 l'ordre  $n$  qui est :  $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x) = T_n(x) + x^n \varepsilon(x)$  où  $T_n(x)$  est le polynôme  $(c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n) \times (d_0 + d_1x + \dots + d_nx^n)$  tronqué à l'ordre  $n$ .

**Tronquer** un polynôme à l'ordre  $n$  signifie que l'on conserve seulement les monômes de degré  $\leq n$ .

### Exemple 35

Calculer le DL de  $\cos x \times \sqrt{1+x}$  en 0 à l'ordre 2. On sait que

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + x^2\varepsilon_1(x) \text{ et } \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2\varepsilon_2(x).$$

Donc :

$$\begin{aligned} \cos x \times \sqrt{1+x} &= \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) \times \left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)\right) \quad \text{on développe} \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2) \\ &\quad - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \\ &\quad + o(x^2) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{5}{8}x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

La notation «petit o» évite de devoir donner un nom à chaque fonction, en ne gardant que sa propriété principale, qui est de décroître vers 0 au moins à une certaine vitesse. Comme on le voit dans cet exemple,  $o(x^2)$  absorbe les éléments de même ordre de grandeur ou plus petits que lui :  $o(x^2) - \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x^2o(x^2) = o(x^2)$ . Mais il faut bien comprendre que les différents  $o(x^2)$  écrits ne correspondent pas à la même fonction, ce qui justifie que cette égalité ne soit pas fausse !

## 3.2. Composition

On écrit encore :

$$f(x) = C(x) + x^n \varepsilon_1(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n + x^n \varepsilon_1(x) \quad g(x) = D(x) + x^n \varepsilon_2(x) = d_0 + d_1x + \dots + d_nx^n + x^n \varepsilon_2(x)$$

### Proposition 29

Si  $g(0) = 0$  (c'est-à-dire  $d_0 = 0$ ) alors la fonction  $f \circ g$  admet un DL en 0 à l'ordre  $n$  dont la partie polynomiale est le polynôme tronqué à l'ordre  $n$  de la composition  $C(D(x))$ .

### Exemple 36

Calcul du DL de  $h(x) = \sin(\ln(1+x))$  en 0 à l'ordre 3.

- On pose ici  $f(u) = \sin u$  et  $g(x) = \ln(1+x)$  (pour plus de clarté il est préférable de donner des noms différents aux variables de deux fonctions, ici  $x$  et  $u$ ). On a bien  $f \circ g(x) = \sin(\ln(1+x))$  et  $g(0) = 0$ .
- On écrit le DL à l'ordre 3 de  $f(u) = \sin u = u - \frac{u^3}{3!} + u^3\varepsilon_1(u)$  pour  $u$  proche de 0.
- Et on pose  $u = g(x) = \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3\varepsilon_2(x)$  pour  $x$  proche de 0.
- On aura besoin de calculer un DL à l'ordre 3 de  $u^2$  (qui est bien sûr le produit  $u \times u$ ) :  $u^2 = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3\varepsilon_2(x)\right)^2 = x^2 - x^3 + x^3\varepsilon_3(x)$  et aussi  $u^3$  qui est  $u \times u^2$ ,  $u^3 = x^3 + x^3\varepsilon_4(x)$ .
- Donc  $h(x) = f \circ g(x) = f(u) = u - \frac{u^3}{3!} + u^3\varepsilon_1(u) = \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3\right) - \frac{1}{6}x^3 + x^3\varepsilon(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + x^3\varepsilon(x)$ .

**Exemple 37**

Soit  $h(x) = \sqrt{\cos x}$ . On cherche le DL de  $h$  en 0 à l'ordre 4.

On utilise cette fois la notation «petit o». On connaît le DL de  $f(u) = \sqrt{1+u}$  en  $u = 0$  à l'ordre 2 :  
 $f(u) = \sqrt{1+u} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + o(u^2)$ .

Et si on pose  $u(x) = \cos x - 1$  alors on a  $h(x) = f(u(x))$  et  $u(0) = 0$ . D'autre part le DL de  $u(x)$  en  $x = 0$  à l'ordre 4 est :  $u = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$ . On trouve alors  $u^2 = \frac{1}{4}x^4 + o(x^4)$ .

Et ainsi

$$\begin{aligned} h(x) &= f(u) = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + o(u^2) \\ &= 1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{1}{4}x^4\right) + o(x^4) \\ &= 1 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{48}x^4 - \frac{1}{32}x^4 + o(x^4) \\ &= 1 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{96}x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

**3.3. Division**

Voici comment calculer le DL d'un quotient  $f/g$ . Soient

$$f(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n + x^n\varepsilon_1(x) \quad g(x) = d_0 + d_1x + \dots + d_nx^n + x^n\varepsilon_2(x)$$

Nous allons utiliser le DL de  $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + \dots$ .

1. Si  $d_0 = 1$  on pose  $u = d_1x + \dots + d_nx^n + x^n\varepsilon_2(x)$  et le quotient s'écrit  $f/g = f \times \frac{1}{1+u}$ .
2. Si  $d_0$  est quelconque avec  $d_0 \neq 0$  alors on se ramène au cas précédent en écrivant

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{d_0} \frac{1}{1 + \frac{d_1}{d_0}x + \dots + \frac{d_n}{d_0}x^n + \frac{x^n\varepsilon_2(x)}{d_0}}.$$

3. Si  $d_0 = 0$  alors on factorise par  $x^k$  (pour un certain  $k$ ) afin de se ramener aux cas précédents.

**Exemple 38**

1. DL de  $\tan x$  en 0 à l'ordre 5.

Tout d'abord  $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + x^5\varepsilon(x)$ . D'autre part  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\varepsilon(x) = 1 + u$  en posant  $u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\varepsilon(x)$ .

Nous aurons besoin de  $u^2$  et  $u^3$  :  $u^2 = \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\varepsilon(x)\right)^2 = \frac{x^4}{4} + x^5\varepsilon(x)$  et en fait  $u^3 = x^5\varepsilon(x)$ . (On note abusivement  $\varepsilon(x)$  pour différents restes.)

Ainsi

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + u^3\varepsilon(u) = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{4} + x^5\varepsilon(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + x^5\varepsilon(x);$$

Finalement

$$\tan x = \sin x \times \frac{1}{\cos x} = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + x^5\varepsilon(x)\right) \times \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + x^5\varepsilon(x)\right) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x).$$

**Autre méthode.** Soit  $f(x) = C(x) + x^n\varepsilon_1(x)$  et  $g(x) = D(x) + x^n\varepsilon_2(x)$ . Alors on écrit la division suivant les puissances croissantes de  $C$  par  $D$  à l'ordre  $n$  :  $C = DQ + x^{n+1}R$  avec  $\deg Q \leq n$ . Alors  $Q$  est la partie polynomiale du DL en 0 à l'ordre  $n$  de  $f/g$ .

**Exemple 39**

DL de  $\frac{2+x+2x^3}{1+x^2}$  à l'ordre 2. On pose  $C(x) = 2 + x + 2x^3$  et  $g(x) = D(x) = 1 + x^2$  alors  $C(x) = D(x) \times (2 + x - 2x^2) + x^3(1 + 2x)$ . On a donc  $Q(x) = 2 + x - 2x^2$ ,  $R(x) = 1 + 2x$ . Et donc lorsque l'on divise cette égalité par  $C(x)$  on obtient  $\frac{f(x)}{g(x)} = 2 + x - 2x^2 + x^2 \varepsilon(x)$ .

**3.4. Intégration**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^n$  dont le DL en  $a \in I$  à l'ordre  $n$  est  $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon(x)$ .

**Théorème 14**

Notons  $F$  une primitive de  $f$ . Alors  $F$  admet un DL en  $a$  à l'ordre  $n+1$  qui s'écrit :

$$F(x) = F(a) + c_0(x-a) + c_1 \frac{(x-a)^2}{2} + c_2 \frac{(x-a)^3}{3} + \dots + c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + (x-a)^{n+1} \eta(x)$$

où  $\lim_{x \rightarrow a} \eta(x) = 0$ .

Cela signifie que l'on intègre la partie polynomiale terme à terme pour obtenir le DL de  $F(x)$  à la constante  $F(a)$  près.

**Exemple 40**

Calcul du DL de  $\arctan x$ .

On sait que  $\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$ . En posant  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  et  $F(x) = \arctan x$ , on écrit

$$\arctan' x = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + x^{2n} \varepsilon(x).$$

Et comme  $\arctan(0) = 0$  alors  $\arctan x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + x^{2n+1} \varepsilon(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$

**4. Applications des développements limités**

Voici les applications les plus remarquables des développements limités. On utilisera aussi les DL lors de l'étude locale des courbes paramétrées lorsqu'il y a des points singuliers.

**4.1. Calculs de limites**

Les DL sont très efficaces pour calculer des limites ayant des formes indéterminées ! Il suffit juste de remarquer que si  $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \dots$  alors  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c_0$ .

**Exemple 41**

Limite en 0 de  $\frac{\ln(1+x) - \tan x + \frac{1}{2} \sin^2 x}{3x^2 \sin^2 x}$ .

Notons  $\frac{f(x)}{g(x)}$  cette fraction. En 0 on a  $f(x) = \ln(1+x) - \tan x + \frac{1}{2} \sin^2 x = (x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)) - (x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)) + \frac{1}{2} (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))^2 = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2} (x^2 - \frac{1}{3} x^4) + o(x^4) = -\frac{5}{12} x^4 + o(x^4)$  et  $g(x) = 3x^2 \sin^2 x = 3x^2 (x + o(x))^2 = 3x^4 + o(x^4)$ .

Ainsi  $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{-\frac{5}{12} x^4 + o(x^4)}{3x^4 + o(x^4)} = \frac{-\frac{5}{12} + o(1)}{3 + o(1)}$  en notant  $o(1)$  une fonction (inconnue) tendant vers 0 quand  $x \rightarrow 0$ .

Donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\frac{5}{36}$ .

Note : en calculant le DL à un ordre inférieur (2 par exemple), on n'aurait pas pu conclure, car on aurait obtenu  $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{o(x^2)}{o(x^2)}$ , ce qui ne lève pas l'indétermination. De façon générale, on calcule les DL à l'ordre le plus bas possible, et si cela ne suffit pas, on augmente progressivement l'ordre (donc la précision de l'approximation).


#### 4.2. Position d'une courbe par rapport à sa tangente

##### Proposition 30


Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction admettant un DL en  $a : f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_k(x-a)^k + (x-a)^k \varepsilon(x)$ , où  $k$  est le plus petit entier  $\geq 2$  tel que le coefficient  $c_k$  soit non nul. Alors l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  en  $a$  est  $y = c_0 + c_1(x-a)$  et la position de la courbe par rapport à la tangente pour  $x$  proche de  $a$  est donnée par le signe  $f(x) - y$ , c'est-à-dire le signe de  $c_k(x-a)^k$ .

Il y a 3 cas possibles.


- Si le signe est positif alors la courbe est au-dessus de la tangente.



- Si le signe est négatif alors la courbe est en dessous de la tangente.



- Si le signe change (lorsque l'on passe de  $x < a$  à  $x > a$ ) alors la courbe traverse la tangente au point d'abscisse  $a$ . C'est un **point d'inflexion**.



Comme le DL de  $f$  en  $a$  à l'ordre 2 s'écrit aussi  $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + (x-a)^2 \varepsilon(x)$ . Alors l'équation de la tangente est aussi  $y = f(a) + f'(a)(x-a)$ . Si en plus  $f''(a) \neq 0$  alors  $f(x) - y$  garde un signe constant autour de  $a$ . En conséquence si  $a$  est un point d'inflexion alors  $f''(a) = 0$ . (La réciproque est fausse.)

**Exemple 42**

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$ .

- Déterminons la tangente en  $\frac{1}{2}$  du graphe de  $f$  et précisons la position du graphe par rapport à la tangente.

On a  $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$ ,  $f''(x) = 12x^2 - 12x$ , donc  $f''(\frac{1}{2}) = -3 \neq 0$  et  $k = 2$ .



On en déduit le DL de  $f$  en  $\frac{1}{2}$  par la formule de Taylor-Young :  $f(x) = f(\frac{1}{2}) + f'(\frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}) + \frac{f''(\frac{1}{2})}{2!}(x - \frac{1}{2})^2 + (x - \frac{1}{2})^2 \varepsilon(x) = \frac{13}{16} - (x - \frac{1}{2}) - \frac{3}{2}(x - \frac{1}{2})^2 + (x - \frac{1}{2})^2 \varepsilon(x)$ .

Donc la tangente en  $\frac{1}{2}$  est  $y = \frac{13}{16} - (x - \frac{1}{2})$  et le graphe de  $f$  est en dessous de la tangente car  $f(x) - y = (-\frac{3}{2} + \varepsilon(x))(x - \frac{1}{2})^2$  est négatif autour de  $x = \frac{1}{2}$ .

- Déterminons les points d'inflexion.

Les points d'inflexion sont à chercher parmi les solutions de  $f''(x) = 0$ . Donc parmi  $x = 0$  et  $x = 1$ .

- Le DL en 0 est  $f(x) = 1 - 2x^3 + x^4$  (il s'agit juste d'écrire les monômes par degrés croissants !). L'équation de la tangente au point d'abscisse 0 est donc  $y = 1$  (une tangente horizontale). Comme  $-2x^3$  change de signe en 0 alors 0 est un point d'inflexion de  $f$ .
- Le DL en 1 : on calcule  $f(1), f'(1), \dots$  pour trouver le DL en 1  $f(x) = -2(x - 1) + 2(x - 1)^3 + (x - 1)^4$ . L'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est donc  $y = -2(x - 1)$ . Comme  $2(x - 1)^3$  change de signe en 1, 1 est aussi un point d'inflexion de  $f$ .



**4.3. Développement limité en  $+\infty$**


Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I = ]x_0, +\infty[$ . On dit que  $f$  admet un **DL en  $+\infty$**  à l'ordre  $n$  s'il existe des réels  $c_0, c_1, \dots, c_n$  tels que

$$f(x) = c_0 + \frac{c_1}{x} + \dots + \frac{c_n}{x^n} + \frac{1}{x^n} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)$$

où  $\varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)$  tend vers 0 quand  $x \rightarrow +\infty$ .

**Exemple 43**

$$f(x) = \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) = \ln 2 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{24x^3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n2^n x^n} + \frac{1}{x^n} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right), \text{ où } \lim_{x \rightarrow \infty} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$




Cela nous permet d'avoir une idée assez précise du comportement de  $f$  au voisinage de  $+\infty$ . Lorsque  $x \rightarrow +\infty$  alors  $f(x) \rightarrow \ln 2$ . Et le second terme est  $+\frac{1}{2}x$ , donc est positif, cela signifie que la fonction  $f(x)$  tend vers  $\ln 2$  tout en restant au-dessus de  $\ln 2$ .

**Remarque**

1. Un DL en  $+\infty$  s'appelle aussi un développement asymptotique.
2. Dire que la fonction  $x \mapsto f(x)$  admet un DL en  $+\infty$  à l'ordre  $n$  est équivalent à dire que la fonction  $x \mapsto f(\frac{1}{x})$  admet un DL en  $0^+$  à l'ordre  $n$ .
3. On peut définir de même ce qu'est un DL en  $-\infty$ .

**Proposition 31**

On suppose que la fonction  $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$  admet un DL en  $+\infty$  (ou en  $-\infty$ ) :  $\frac{f(x)}{x} = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_k}{x^k} + \frac{1}{x^k} \varepsilon(\frac{1}{x})$ , où  $k$  est le plus petit entier  $\geq 2$  tel que le coefficient de  $\frac{1}{x^k}$  soit non nul. Alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (a_0x + a_1) = 0$  (resp.  $x \rightarrow -\infty$ ) : la droite  $y = a_0x + a_1$  est une **asymptote** à la courbe de  $f$  en  $+\infty$  (ou  $-\infty$ ) et la position de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de  $f(x) - y$ , c'est-à-dire le signe de  $\frac{a_k}{x^{k-1}}$ .




**Démonstration**

On a  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - a_0x - a_1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{x^{k-1}} + \frac{1}{x^{k-1}} \varepsilon(\frac{1}{x}) = 0$ . Donc  $y = a_0x + a_1$  est une asymptote à la courbe de  $f$ . Ensuite on calcule la différence  $f(x) - a_0x - a_1 = \frac{a_k}{x^{k-1}} + \frac{1}{x^{k-1}} \varepsilon(\frac{1}{x}) = \frac{a_k}{x^{k-1}} (1 + \frac{1}{a_k} \varepsilon(\frac{1}{x}))$ .

**Exemple 44**

Asymptote de  $f(x) = \exp \frac{1}{x} \cdot \sqrt{x^2 - 1}$ .



1. En  $+\infty$ ,

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} &= \exp \frac{1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = \exp \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \\ &= \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + \frac{1}{x^3} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x^3} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)\right) \\ &= \dots = 1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x^3} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

Donc l'asymptote de  $f$  en  $+\infty$  est  $y = x + 1$ . Comme  $f(x) - x - 1 = -\frac{1}{3x^2} + \frac{1}{x^2} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ , le graphe de  $f$  reste en dessous de l'asymptote.

2. En  $-\infty$ .  $\frac{f(x)}{x} = \exp \frac{1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = -\exp \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = -1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x^3} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)$ . Donc  $y = -x - 1$  est une asymptote de  $f$  en  $-\infty$ . On a  $f(x) + x + 1 = \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{x^2} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)$  quand  $x \rightarrow -\infty$  ; le graphe de  $f$  reste au-dessus de l'asymptote.

**5. Exercice**

1. Écrire les trois formules de Taylor en 0 pour  $x \mapsto \cos x$ ,  $x \mapsto \exp(-x)$  et  $x \mapsto \operatorname{sh} x$ .
2. Écrire les formules de Taylor en 0 à l'ordre 2 pour  $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ ,  $x \mapsto \tan x$ .
3. Avec une formule de Taylor à l'ordre 2 de  $\sqrt{1+x}$ , trouver une approximation de  $\sqrt{1,01}$ . Idem avec  $\ln(0,99)$ .
4. Calculer le DL en 0 de  $x \mapsto \operatorname{ch} x$  par la formule de Taylor-Young. Retrouver ce DL en utilisant que  $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ .
5. Écrire le DL en 0 à l'ordre 3 de  $\sqrt[3]{1+x}$ . Idem avec  $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ .
6. Écrire le DL en 2 à l'ordre 2 de  $\sqrt{x}$ .
7. Justifier l'expression du DL de  $\frac{1}{1-x}$  à l'aide de l'unicité des DL de la somme d'une suite géométrique.
8. Calculer le DL en 0 à l'ordre 3 de  $\exp(x) - \frac{1}{1+x}$ , puis de  $x \cos(2x)$  et  $\cos(x) \times \sin(2x)$ .
9. Calculer le DL en 0 à l'ordre 2 de  $\sqrt{1+2\cos x}$ , puis de  $\exp(\sqrt{1+2\cos x})$ .
10. Calculer le DL en 0 à l'ordre 3 de  $\ln(1 + \sin x)$ . Idem à l'ordre 6 pour  $(\ln(1 + x^2))^2$ .

11. Calculer le DL en 0 à l'ordre  $n$  de  $\frac{\ln(1+x^3)}{x^3}$ . Idem à l'ordre 3 avec  $\frac{e^x}{1+x}$ .
12. Par intégration retrouver la formule du DL de  $\ln(1+x)$ . Idem à l'ordre 3 pour  $\arccos x$ .
13. Calculer la limite de  $\frac{\sin x - x}{x^3}$  lorsque  $x$  tend vers 0. Idem avec  $\frac{\sqrt{1+x} - \operatorname{sh} \frac{x}{2}}{x^k}$  (pour  $k = 1, 2, 3, \dots$ ).
14. Calculer la limite de  $\frac{\sqrt{x} - 1}{\ln x}$  lorsque  $x$  tend vers 1. Idem pour  $\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{\frac{1}{x}}$ , puis  $\frac{1}{\tan^2 x} - \frac{1}{x^2}$  lorsque  $x$  tend vers 0.
15. Soit  $f(x) = \exp x + \sin x$ . Calculer l'équation de la tangente en  $x = 0$  et la position du graphe. Idem avec  $g(x) = \operatorname{sh} x$ .
16. Calculer le DL en  $+\infty$  à l'ordre 5 de  $\frac{x}{x^2-1}$ . Idem à l'ordre 2 pour  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ .
17. Soit  $f(x) = \sqrt{\frac{x^3+1}{x+1}}$ . Déterminer l'asymptote en  $+\infty$  et la position du graphe par rapport à cette asymptote.